

---

**CENTURIE**

DE CARABIQUES NOUVEAUX, PAR M. GORY.

(Séance du 5 décembre 1832.)

---

Aucune famille n'est plus nombreuse et plus variée, comme on sait, et ne laisse plus à décrire que celle des Carabiques. Après tous les travaux divers de plusieurs entomologistes et en dernier lieu, de M. le comte Dejean qui a publié toutes les belles et innombrables espèces que contient sa collection, j'ai cru qu'il ne serait pas indifférent pour la science de faire connaître les espèces inédites qui sont dans mon cabinet, et j'ai pensé à les offrir réunies en une centurie; puissent mes faibles efforts obtenir l'approbation, et trouver des imitateurs.

Plusieurs amateurs m'ont communiqué des matériaux pour ce travail, et principalement MM. Melly, Buquet, Delaporte et Chevrolat. Je me plais ici à leur payer un juste tribut de reconnaissance.

## TABLEAU

*Des genres et espèces contenus dans cette centurie.*

- |  |   |
|--|---|
| 1. Megacephala Lacordaire, GORY.<br>Cayenne.     | 28. <i>Id.</i> Cœca, GORY. Brésil.                          |
| 2. Cicindela Varians, GORY. <i>Id.</i>           | 29. <i>Id.</i> Nigromaculata, GORY. Carth.                  |
| 3. <i>Id.</i> Lacordaire, DEJEAN. <i>Id.</i>     | 30. <i>Id.</i> Pallipes, GORY. Carthagène.                  |
| 4. <i>Id.</i> Brunet, BUQUET. Sénégal.           | 31. Coptodera Flavo-signata, GORY.<br>Sénégal.              |
| 5. <i>Id.</i> Ismenia, BUQUET. Grèce.            | 32. <i>Id.</i> Viridipennis, GORY. Java.                    |
| 6. <i>Id.</i> Vidua, GORY. Cap B.-Espér.         | 33. <i>Id.</i> Velox, LACORDAIRE. Cayenne.                  |
| 7. <i>Id.</i> Hispanica, GORY. Espagne.          | 34. Orthogonius Malabariensis. GOR.                         |
| 8. <i>Id.</i> Sobrina, GORY. Italie.             | 35. <i>Id.</i> Nigripennis, GORY. Cayenne.<br>Malabar.      |
| 9. <i>Id.</i> Venustula, GORY. Cayenne.          | 36. Helluo Heros, GORY. Brésil.                             |
| 10. <i>Id.</i> Guérin, GORY. Cayenne.            | 37. Brachinus Riffaud, GORY. Egypt.                         |
| 11. Casnoia 4-maculata, GORY.<br>Cayenne.        | 38. <i>Id.</i> Cinctus, GORY. Sénégal.                      |
| 12. <i>Id.</i> Maculicornis, GOR. Cayenne.       | 39. <i>Id.</i> Gory, BUQUET. Sénégal.                       |
| 13. <i>Id.</i> Gemiculata, CHEVROL. Brésil.      | 40. <i>Id.</i> Leprieur, BUQUET. Sénégal.                   |
| 14. Ctenodactyla Drapiez, GORY.<br>Cayenne.      | 41. <i>Id.</i> Galamensis, BUQUET. Sénégal.                 |
| 15. <i>Id.</i> Maculata, GORY. Cayenne.          | 42. <i>Id.</i> Brasiliensis, GORY. Brésil.                  |
| 16. <i>Id.</i> Tristis, GORY. Cayenne.           | 43. <i>Id.</i> Æquinoctialis, GORY. Carth.                  |
| 17. Zuphium Fleuriasi, BUQUET.<br>Sénégal.       | 44. Eurydera Spinosa, GORY. Mada-<br>gascar.                |
| 18. Agra Buquet, GORY. Brésil.                   | 45. <i>Id.</i> Flavicornis, GORY. Madagasc.                 |
| 19. <i>Id.</i> Biunipennis, GORY. Cayen.         | 46. Catascopus Rnfipes, BUQUET.<br>Sénégal.                 |
| 20. <i>Id.</i> Chevrolat, GORY. Brésil.          | 47. <i>Id.</i> Madagascariensis, GORY. Ma-<br>dagascar.     |
| 21. Cymindis Guadelupensis, GORY.<br>Guadeloupe. | 48. Graphyterus {Arcuatus, GORY.<br>Cap de Bonne-Espérance. |
| 22. <i>Id.</i> Maculata, GORY. Carthagène.       | 49. <i>Id.</i> Obscurus, HOPE. Caffrerie.                   |
| 23. Calleida Rufula, GORY. Sénégal.              | 50. Scarites Doguerau, GORY. Cap<br>de Bonne-Espérance.     |
| 24. <i>Id.</i> Splendida, GORY. Brésil.          | 51. <i>Id.</i> Hope, GORY. Cap B.-Espér.                    |
| 25. Plochionus Bcisduval, BUQUET.<br>Sénégal.    | 52. Clivina Striatipennis, GORY.<br>Cayenne.                |
| 26. Lebia Viard, GORY. Brésil.                   |   |
| 27. <i>Id.</i> Elegans, GORY. Cayenne.           |   |

53. *Carabus* Prevost, GORY. Sibérie.
54. *Id.* Carcel, DELAPORTE. Smyrne.
55. *Omophron* Capense, GORY. Cap de Bonne-Espérance.
56. *Panagœus* Regalis, GORY. Sénégal.
57. *Id.* Myops, GORY. Sénégal.
58. *Id.* Vicinus, GORY. Brésil.
59. *Callistus* 4-Pustulatus, GORY. Cap de Bonne-Espérance.
60. *Chlœnius* Guérin, GORY. Sénégal.
61. *Id.* Opulentus, DUPT., Sénégal.
62. *Id.* Mirabilis, BUQUET. Sénégal.
63. *Id.* Ernest, BUQUET. Sénégal.
64. *Id.* Porcatus, GORY. Ind. Orient.
65. *Id.* Max, GORY. Sénégal.
66. *Id.* Brunel, BUQUET. Sénégal.
67. *Id.* Gory, BUQUET. Sénégal.
68. *Id.* Leprieur, BUQUET. Sénégal.
69. *Id.* Auricollis, GORY. Cap de Bonne-Espérance.
70. *Id.* Algerinus, GORY. Alger.
71. *Id.* Capensis, GORY. Cap de Bonne-Espérance.
72. *Id.* Marginipennis, GORY. Cap de Bonne-Espérance.
73. *Epomis* Capensis, GORY. Cap de Bonne-Espérance.
74. *Id.* Senegalensis, GORY. Sénégal.
75. *Oodes* Gory, BUQUET. Sénégal.
76. *Id.* Rufipes, GORY. Sénégal.
77. *Id.* Politus, GORY. Sénégal.
78. *Dolichus* Rufus, GORY. Cap de Bonne-Espérance.
79. *Pristonychus* Algerinus, GORY. Alger.
80. *Id.* Chilensis, GORY. Chili.
81. *Omalosoma* Vigorsa, GORY. Nouvelle-Hollande.
82. *Feronia* (Pœculus) Cyanea, CHEVROLAT. Alger.
83. *Zabrus* Gibbosus, MÉNESTRIER. Russie méridionale.
84. *Id.* Globosus, GORY. Alger.
85. *Amblygnathus* Niger, GORY. Brésil.
86. *Sélénophorus* Confusus, GORY. Sénégal.
87. *Id.* Fulvipes, GORY. Sénégal.
88. *Id.* Cupreus, GORY. Sénégal.
89. *Id.* Cupripeunis, GORY. Cayenne.
90. *Hypolithus* Vicinus, GORY. Cayenne.
91. *Id.* Javanus, GORY. Java.
92. *Harpalus* Gory, BOISDUVAL. Nouvelle-Hollande.
93. *Tetragonoderus* Bax, GORY. Sénégal.
94. *Id.* 4-maculatus, GORY. Sénégal.
95. *Id.* Leprieur, BUQUET. Sénégal.
96. *Lachnophorus* Niger, GORY. Cayenne.
97. *Id.* Bi-punctatus, GORY. Cayenne.
98. *Bembidium* Cupreum, GORY. Sénégal.
99. *Id.* Aurichalceum, LACORDAIRE. Cayenne.
100. *Id.* Taciturnum, GORY. Sénégal.

*Megacephala Lacordairei* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 7 lignes 172, larg. 2 lign. 374)

*Cyanei-obscura; ore, antennis, ano pedibusque ferrugineis; elytris punctatis, cyaneis.*

Tête grosse; front large; yeux assez saillans; lèvre supérieure courte, transversale.

Corselet plus large antérieurement que la tête, se rétrécissant postérieurement.

Elytres allongées, cylindriques, plus larges que le corselet, arrondies à leur extrémité, ponctuées, surtout vers leur base.

Lèvre supérieure, mandibules, palpes, antennes, excepté les deuxième, troisième, quatrième et cinquième articles qui sont plus obscurs, extrémité de l'abdomen et pattes ferrugineux.

Cette belle espèce a été rapportée par M. Lacordaire du voyage qu'il a fait à Cayenne en 1831 et 1832.

*Cicindela Varians* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

Cicind. Gilvipes, Dej. catal. pag. 2.

(Long. 4 lign. 172.)

*Cylindrica, supra viridi obscura ænea, subtus viridi cyanea; ore, antennis pedibusque flavis; elytris punctatis maculisque tribus marginalibus albis.*

Tête creusée entre les yeux, couverte de petites rides

longitudinales; yeux gros; corselet cylindrique, son bord antérieur un peu prolongé sur la tête, carré à sa base, couvert de petits points enfoncés très serrés, avec deux impressions transversales, la première après le bord antérieur, la seconde avant la base.

Ecusson petit, triangulaire.

Elytres couvertes de points enfoncés, très serrés; carrées à leur base, coupées obliquement à l'extrémité et sur chaque, trois points blancs placés du côté externe, le premier petit à l'angle huméral, le second plus fort un peu après le milieu de sa longueur, et le troisième un peu dilaté en bande tout-à-fait terminale.

En dessus, vert bronzé obscur, avec des reflets plus cuivreux sur la tête et le corselet; dessous vert bleu; bouche, yeux, antennes et pattes fauve pâle.

*Cicindela Lacordairei* (DEJEAN, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

*Cicind. Lacordairei*, Dej. catal. pag. 2.

(Long. 3 lign. 172.)

*Cylindrica*, supra viridi obscuro aenea, subtus viridi cyanea, elytris punctatis maculisque duabus marginalibus albidis, pedibus flavis.

Elle ressemble à la *Brasiliensis* pour la forme, mais elle est plus petite. Tête large entre les yeux, couverte de petites rides longitudinales dans toute cette partie; yeux très gros, brun noir.

Antennes au moins aussi longues que la moitié du corps.

Corselet cylindrique, finement ponctué avec une ligne lon-

gitudinale dans son milieu à peine visible et une impression transversale après son bord antérieur et une autre avant sa base.

Ecusson petit, triangulaire, aigu.

Elytres couvertes de gros points enfoncés, réguliers; carrées à la base, coupées obliquement à l'extrémité avec deux points blancs sur les côtés externes le premier vers les deux tiers de la longueur, le second à l'extrémité.

Entièrement vert obscur, cuivreux en dessus; vert bleu en dessous, pattes fauve pâle.

*Cicindela Brunet* (BUQUET, Sénégal), du cabinet de M. Buquet.

(Long. 6 lign., larg. 2 lign.)

*Cylindrica; cyanea; elytris profundi punctatis.*

Tête assez large et fortement striée, surtout près des yeux qui sont très saillans.

Corselet plus long que large, arrondi au milieu et un peu rétréci postérieurement avec deux sillons transversaux, l'un près du bord supérieur et l'autre un peu au-dessous de sa base; la ligne longitudinale qui est dans son milieu est peu apparente et joint les deux sillons, il est très fortement strié.

Ecusson triangulaire, ponctué; élytres cylindriques, élargies légèrement vers l'extrémité, épineuses à la suture, couvertes de gros points réguliers; vers l'extrémité, le long de la suture, sept gros points.

Entièrement d'un très beau bleu.

*Cicindela Ismenia* (BUQUET, Grèce), du cabinet de  
M. Buquet.

Cic. Ismenia, Buquet. Dej. catal. pag. 3.

(Long. 5 lign. 172, larg. 2 lign. 374.)

*Viridis, pectore pedibusque rubro cupreis, elytris punctis,  
maculis quatuor albidis.*

Lèvre supérieure jaunâtre avancée, presque arrondie; tête méplate large, fortement striée longitudinalement; yeux peu saillans; corselet court, strié, presque carré, à-peu-près de la largeur de la tête à sa partie antérieure, et un peu rétréci postérieurement, avec deux sillons transversaux, l'un près du bord supérieur, l'autre près de la base, et une ligne longitudinale qui joint les deux sillons.

Elytres plus larges que le corselet, peu convexes, presque planes, allongées, arrondies à l'extrémité; sur chaque, deux taches, la première, placée vers les deux tiers de la longueur et près du bord externe; la seconde, à l'extrémité; tête, dessus du corselet, élytres, verts.

Antennes, dessous du corps excepté l'abdomen qui est bleu, rouge cuivreux, taches blanches.

*Cicindela Vidua* (GORY, cap Bonne-Espérance), du  
cabinet de M. Gory.

(Long. 5 lign. 172, larg. 2 lign. 174.)

*C. Suprà nigro-obscura, subtùs viridi-cyanea; elytris punctis duobus ad basin tribusque ternibus fasciis albis.*

Lèvre supérieure transversale, légèrement avancée avec trois dents dans son milieu.

Tête assez grosse, creusée entre les yeux; yeux assez saillans.

Corselet aussi large antérieurement que la tête, un peu plus étroit postérieurement, légèrement granulé; les deux sillons transversaux et la ligne longitudinale peu marqués.

Elytres larges, planes, arrondies à leur extrémité, légèrement épineuses à la suture, plus fortement ponctuées à leur base que sur tout le reste; sur chaque élytre, deux points et trois bandes: le premier assez gros à l'angle huméral; le deuxième beaucoup plus petit à la base près de la suture. La première bande fait suite au premier point et descend sur l'élytre presque jusqu'à son tiers en se dirigeant vers la suture; la seconde dont la naissance est du côté de son bord externe, prend vers les deux tiers, s'abaisse un peu et se courbe en forme de C vers la suture; la troisième enfin est terminale, et longe l'extrémité de l'élytre.

Dessus du corps noir mat, dessous vert bleu foncé; lèvre supérieure, mandibules, excepté l'extrémité, palpes, points et bandes blanc jaunâtre.

Cette espèce a été rapportée par les fils Verreaux.

*Cicindela Hispanica* (GORY, Espagne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 6 lign. 172, larg. 2 lign. 172.)

*C. Viridi-fusca*, *elytris lunula humerali apicalique integra, fasciaque media sinuata ad marginem lateralem dilatata albis.*

Lèvre supérieure transversale, peu avancée avec trois petites dents.

Tête assez bombée, chagrinée; yeux moyens; corselet coupé carrément, antérieurement, et postérieurement; se rétrécissant postérieurement. Elytres ponctuées, plus larges que le corselet, arrondies à leur extrémité.

Dessus du corps, vert foncé mat; dessous, vert cuivreux, couvert de petits poils blanchâtres.

Sur chaque élytre, trois bandes : la première forme la lunule humérale, la seconde occupe une partie du bord externe, se dilate transversalement dans son milieu et se recourbe en forme de C sans atteindre la suture, la troisième occupe la terminaison, elle s'élargit vers la suture et a un crochet à sa partie supérieure qui se dirige vers la courbure de la seconde bande; elles sont, ainsi que le labre, d'un blanc jaunâtre.

J'ai reçu cette espèce des environs de Cadix.

*Cicindela Sobrina* (GORY, Italie), du cabinet de M. Gory.

(Long. 5 lign., larg. 1 lign. 3/4.)

*Subcylindrica, viridi obscura; elytris puncto humerali macula marginali, lunulaque apicis albis.*

Cette espèce est très voisine de la *Germanica* de Fabricius, je croyais même que ce n'en était qu'une variété; mais en ayant eu un grand nombre d'individus identiques entre eux, je me suis convaincu qu'elle devait former une espèce.

Lèvre supérieure avancée, avec trois petites dents peu saillantes; arrondie; tête grosse, fortement striée entre les yeux; yeux très saillans; corselet un peu plus étroit que la tête, plus long que large et presque cylindrique, les deux

sillons transversaux, et la ligne longitudinale à peine apparents.

Elytres assez allongées, s'élargissant vers l'extrémité avec deux lignes longitudinales de points assez marqués.

Sur chaque élytre, un petit point arrondi à la base, au milieu, un plus gros près du bord externe, qui se termine par une petite ligne se dirigeant vers la suture, et une tache en croissant à l'extrémité; ces points blanc mat.

Lèvre supérieure et palpes jaunâtres; tête, corselet, dessous du corps vert obscur; élytres et pattes, vert très foncé.

Cette espèce est propre à l'Italie.

*Cicindela Venustula* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 3 lign. 1/2, larg. 1 lign. 3/4.)

*C. Elytris viridi-nigricentibus, capite, thorace, abdomine pedibusque viridi-cupreis, puncto fasciâque mediâ sinuatâ transversâ, apicali irregulari albis.*

Lèvre supérieure avancée, arrondie; tête grosse; yeux saillans; corselet étroit, plus long que large, cylindrique.

Elytres presque une fois plus larges que le corselet, assez planes, et presque en forme de parallélogramme, épineuses à la suture. Tête, corselet, les trois premiers articles des antennes, dessous du corps, vert cuivreux; autres articles des antennes et élytres noir mat, avec beaucoup de petits atomes rouges-lacques que l'on aperçoit à la loupe.

Sur chaque élytre un point et deux bandes: le point placé sur le disque, la bande qui n'atteint ni le bord externe, ni la suture, est en forme de zigzag, et la partage

dans son milieu ; l'autre, irrégulière est en forme de lunule, borde son extrémité ; points et bandes blanc jaunâtre.

Cette jolie petite espèce se trouvait dans une collection de Cayenne, que j'ai achetée en 1830 ; M. Lacordaire vient aussi de la rapporter du même pays.

*Cicindela Guérin* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

Cicind. Parvula? Dej. catal., pag. 5.

(Long. 3 lign.)

*Subcylindrica, supra viridi fusco-ænea; elytris lunula, vitta media transversa et longitudinali, punctoque fulvis.*

Lèvre supérieure et moitié des mandibules, fauve très pâle, extrémité noire.

Tête très finement ponctuée; corselet presque cylindrique, peu allongé.

Elytres carrées à la base, arrondies à l'extrémité.

Sur chaque, une lunule humérale, une petite bande vers le milieu de sa longueur, qui prend au bord externe, s'avance transversalement, descend jusqu'au deux tiers de sa longueur un peu avant d'être arrivée à la suture, et se termine par un crochet; à l'extrémité, un petit point.

Dessus, d'un vert rouge cuivreux; tête, corselet, antennes et pattes d'une couleur plus bronzée; dessous, vert bleu, couvert de poils blanchâtres.

*Casnonia Quadri-maculata* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 3 lign.  $\frac{3}{4}$ , larg. 1 lign.)

*Nigro-violacèa, elytris striatis, luteo bimaculatis; antennis pedibusque rufis, pallido variegatis.*

Tête lisse, grande, presque en forme de parallélogramme, large entre les yeux, assez avancée antérieurement, prolongée postérieurement, très mince un peu avant sa jonction au corselet, et terminée par un nœud arrondi et un peu renflé, qui s'enchâsse dans ce dernier.

Mandibules assez saillantes; antennes plus longues que la tête et le corselet réunis.

Corselet lisse, beaucoup plus étroit que la tête, cylindrique, renflé postérieurement, avec les bords antérieur et postérieur relevés.

Elytres plus larges que la tête, un peu arrondies postérieurement et tronquées un peu obliquement à l'extrémité, striées avec des points assez profonds et serrés.

Sur chaque élytre deux taches perpendiculaires.

Corps noir violacé; mandibules, antennes, taches des élytres et pattes d'un fauve clair.

Cet insecte se trouvait dans une collection de Cayenne que j'ai achetée en 1830; M. Lacordaire l'a pris pendant son séjour dans ce pays.

*Casonia Maculicornis* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 4 lign., larg. 1 lign.)

*Brunnea*; thorace cylindrico; elytris striato punctatis, antennis pedibusque maculatis.

Tête en forme de parallélogramme, peu avancée antérieurement, très rétrécie postérieurement.

Corselet allongé, presque cylindrique, très renflé postérieurement, avec les bords antérieur et postérieur relevés.

Ecusson petit, triangulaire.

Elytres striées, ponctuées, parallèles, très échancrées à l'extrémité; avec deux épines, une extérieure, et l'autre à la suture, très prononcées, couvertes de petites élévations qui se confondent.

Brun noir.

Antennes avec le troisième article ferrugineux, les septième, huitième et neuvième d'un blanc sale.

Pattes ferrugineuses, avec la base des cuisses blanc sale.

Cet insecte a été trouvé à Cayenne par M. Lacordaire, et rapporté par lui; il porte le numéro sept dans son catalogue.

*Casonia Genuiculata* (CHEVROLAT, Brésil), du cabinet de M. Chevrolat.

(Long. 4 lign.)

*Nigra-fusca*; elytris postice duabus parvis lineis, flavis; antennis pedibusque fulvis, genibus nigris.

Tête en forme de parallélogramme, lisse, très large entre

les yeux, prolongée postérieurement, très mince avant sa jonction au corselet, de fortes impressions sur sa partie antérieure.

Corselet très étroit, cylindrique, renflé dans son milieu, avec sa partie antérieure et sa base relevées; avec la loupe on aperçoit de petites rides transversales.

Elytres plus larges que la tête, légèrement tronquées à leur extrémité.

Sur chaque quelques petites côtes, à la base et à l'extrémité; sur celles de l'extrémité deux petites taches blanchâtres, longitudinales.

Brun noir, avec les antennes et les pattes fauves et les genoux noirs.

Sur tout le corps quelques poils roussâtres très disséminés.

*Ctenodactyla Drapiez* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 5 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 2 lign.)

*Viridi obscura; elytris striatis, punctatis, ultimis articulis antennarum pedibusque flavis.*

Tête assez grande, large, surtout entre les yeux, rétrécie brusquement à sa partie postérieure.

Corselet moins large que la tête; presque plane, coupé carrément; à sa partie postérieure un sillon large, enfoncé de chaque côté; près des angles postérieurs on aperçoit quelques points dedans, une ligne longitudinale dans son milieu; élytres beaucoup plus larges que le corselet, allongées, planes, arrondies à leur base et à leur extrémité, sur

chacune on distingue neuf lignes formées de petits points enfoncés, assez serrés; sur la troisième ligne, du côté de la suture, il y a six points plus larges et moins enfoncés, placés à égale distance.

Tête, corselet, premier et deuxième articles des antennes, brun rouge, très foncé, luisant.

Elytres, dessous du corps brun rouge, très foncé, chatoyant en vert.

Antennes, excepté les deux premiers articles, et pattes fauve clair.

Cette espèce m'a été donnée par M. Drapiez.

*Ctenodactyla Maculata* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

Ctenod. Lacordairei<sup>?</sup> Dej. catalog., p. 6.

(Long. 5 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 1 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Capite, elytrisque nigris; thorace quatuor maculisque elytrorum, pedibusque fulvis.*

Tête arrondie, large entre les yeux, rétrécie brusquement à sa partie postérieure, tenant au corselet par un col court et cylindrique.

Corselet lisse, plus long que large, bombé, très étroit antérieurement, s'élargissant, coupé carrément postérieurement; sur son milieu une petite ligne longitudinale enfoncée; élytres beaucoup plus larges que la tête, coupées carrément à la base, arrondies à leur extrémité: elles sont striées et finement ponctuées; sur chaque, deux taches, la première sur le disque, la deuxième vers les deux tiers et

occupant presque tout le reste ; en outre , le long du bord externe une petite bande marginale.

Les taches, la bande, les trois premiers articles des antennes, le corselet et les pattes, fauves ; la tête, les derniers articles des antennes et les élytres, noirs.

Cet insecte a été envoyé de Cayenne par M. Lacordaire, et désigné dans le catalogue de son deuxième envoi sous le numéro 18.

*Ctenodactyla Tristis* (GORY, Cayenne), de la collection de M. Gory.

Ctenod. Obscura ? Dej. catal., pag. 6.

(Long. 3 lig., larg. 1 lig.)

*Nigro-obscura*, *antennis pedibusque flavis*.

Tête lisse, moyenne, élargie entre les yeux, très rétrécie postérieurement, tenant au corselet par un col court.

Corselet un peu plus long que la tête, étroit antérieurement, s'élargissant, et coupé carrément postérieurement ; avec des stries fines, transversales, et une petite ligne longitudinale enfoncée, à peine apparente.

Elytres légèrement striées et finement ponctuées, très larges, coupées carrément à leur base, arrondies à leur extrémité.

Antennes, cuisses, pattes et tarses, jaune pâle : tout le reste du corps noir bronzé.

Cet insecte a été envoyé de Cayenne par M. Lacordaire, et désigné dans le catalogue de son deuxième envoi sous le numéro 19.

*Zuphium Fleuriasi* (BUQUET, Sénégal), du cabinet de M. Buquet.

(Long. 5 lig.  $\frac{1}{2}$ , larg. 2 lig.)

*Rufum, elytris cum maculâ rotundatâ.*

Tête triangulaire, tenant au corselet par un col très court, cylindrique, très petit.

Corselet très finement ponctué, en forme de cœur allongé et tronqué, plus large que la tête à sa partie antérieure, bordé, avec ses angles postérieurs très relevés et une ligne longitudinale, peu sentie dans son milieu.

Ecusson petit, triangulaire.

Elytres allongées, arrondies à la base, carrées à l'extrémité, finement striées et ponctuées, les bords externes relevés.

Sur chaque élytre une grande tache à l'extrémité plus obscure que le reste du corps, qui est rouge ferrugineux.

Tout cet insecte est d'une forme aplatie.

*Agra Buqueti* (GORY, Brésil), du cabinet de M. Buquet.

(Long. 9 lig.  $\frac{1}{2}$ , larg. 2 lig.)

*Viridi cyanea; capite angusto-ovali, lævi, postice sparse punctato; elytris profunde striato punctatis, apice oblique truncato-emarginatis, subbidentatis; antennis pedibusque ferrugineis.*

Tête aplatie, arrondie postérieurement, et tenant au corselet par un col court, cylindrique.

Corselet arrondi, renflé postérieurement, avec des points enfoncés, disposés en lignes longitudinales, et les intervalles entre ces lignes un peu relevés.

Elytres parallèles, arrondies à la base, tronquées obliquement à l'extrémité, avec la dent extérieure et celle de la suture très saillantes.

Chaque élytre striée et fortement ponctuée; les points sont plus marqués en se rapprochant du côté externe; entièrement d'un bleu-verdâtre très obscur, avec les antennes et les pattes d'un rouge ferrugineux.

*Agra Brunipennis* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 7 lign., larg. 2 lign.)

*OEnco-fusca*; capite ovali, lævi; elytris lineatæ punctatis, apice subtruncatis, extrorsum unidentatis; antennis pedibusque ferrugineis.

Tête de forme ovale, allongée, lisse, avec deux petites lignes longitudinales enfoncées, de chaque côté entre les yeux.

Corselet un peu plus long que la tête, assez étroit antérieurement, s'élargissant postérieurement; lisse, avec un sillon de chaque côté, dans lequel on aperçoit quelques gros points irrégulièrement placés.

Ecusson petit, arrondi.

Elytres deux fois plus larges que le corselet, tronquées un peu obliquement à leur extrémité, avec des lignes longitudinales formées par de gros points enfoncés; noir bronzé, antennes, palpes et pattes, ferrugineux.

Cette espèce m'a été envoyée de Cayenne.

*Agra Chevrolat* (GORY, Brésil intérieur), du cabinet de M. Gory.

(Long. 5 lign.  $\frac{3}{4}$ , larg. 1 lign.  $\frac{1}{4}$ .)

*Cylindrica, viridi cuprea, capite ovali, lævi, thorace lineato profunde punctato; elytris profunde punctato excavatis apice truncatis; capite, antennis, abdomine pedibusque rufis.*

Tête ovale, lisse, un peu rétrécie entre les yeux, avec une petite ligne longitudinale à sa partie postérieure.

Corselet une fois plus long que la tête, beaucoup plus étroit à sa partie antérieure; à-peu-près de même largeur à sa base, avec deux sillons peu marqués, dans lesquels on aperçoit, vers la base, des points enfoncés, irréguliers, les bords antérieur et postérieur relevés.

Elytres plus larges que la tête, tronquées carrément à leur extrémité; sur leur base, de petites lignes enfoncées, avec des points; sur le reste, des taches irrégulièrement placées, avec des points dans leur enfoncement; palpes, tête, antennes, abdomen et pattes, brun rouge; élytres, cuivre rouge avec les taches vertes.

Cette espèce, qui est une des plus petites, m'a été donnée par M. Chevrolat auquel je l'ai dédiée.

*Cymindis Guadelupensis* (GORY, Guadeloupe), du cabinet de M. Gory.

(Long. g.  $\frac{1}{2}$ .)

*Fusca, elytris striatis subtilissime punctatis, margine laterali maculisque sparsis obsoletis; antennis pedibusque fulvis.*

Elle ressemble, à la première vue, à la *Variiegata* de Dej.

Tête finement granulée antérieurement; corselet en cœur, avec les bords latéraux très relevés et saillans, une ligne longitudinale très fine dans son milieu, les angles antérieurs très saillans.

Ecusson très petit, triangulaire.

Elytres striées et très finement ponctuées. Sur chaque élytre, une ligne longitudinale sur le bord externe; un point au milieu de sa base et une petite tache irrégulière presque à son extrémité; de plus, quelques petits atomes sur son milieu.

Entièrement brune.

Ligne, point, tache, atomes, antennes et pattes fauves.

*Cymindis Maculata* (GORY, Colombie), du cabinet de M. Gory.

(Long. 4 lig., larg. 1 lig.  $\frac{1}{2}$ .)

*Brunnea; elytris punctato striatis, margine laterali maculisque sparsis obsoletis; antennis pedibusque ferrugineis.*

Cette espèce ressemble beaucoup à la *Variegata*, décrite par M. le comte Dejean, dans son *Species*, pag. 217, n. 19. Cependant elle en diffère par la forme du corselet et par les élytres, qui sont plus étroites.

Tête ovale, assez avancée, peu rétrécie postérieurement, fortement ridée longitudinalement entre les yeux, avec une impression assez profonde près l'insertion de chaque antenne.

Corselet plane, cordiforme, plus long que large, échancré antérieurement, prolongé postérieurement; ses bords latéraux très relevés, avec ses angles de la base très saillans,

une ligne longitudinale peu enfoncée dans son milieu, et beaucoup de rides transversales; de plus, à sa partie antérieure, vis-à-vis de la tête, quelques rides longitudinales qui n'arrivent pas jusqu'au tiers de sa longueur.

Elytres étroites, allongées, striées, et légèrement ponctuées.

Sur chaque élytre, une bande marginale latérale, plusieurs petites taches placées irrégulièrement, et vers l'extrémité; près du bord extérieur on en distingue trois ou quatre près l'une de l'autre, qui sont plus apparentes.

Tête noire; corselet, élytres, dessous du corps brun rouge foncé; premier article des antennes, bande latérale marginale, taches, jaune ferrugineux.

*Calleida Rufula* (GORY, Sénégal), du cabinet de  
M. Buquet.

(Long. 4 lign., larg. 1 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Ferrugineu, elytris striatis, striis interstitiisque punctatis truncatis.*

Tête allongée, ponctuée; corselet ponctué, allongé, arrondi antérieurement, coupé carrément à la base; ses angles postérieurs un peu relevés, avec une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu. Elytres allongées, parallèles, arrondies à la base, tronquées à l'extrémité; striées et ponctuées dans les stries et dans les intervalles; entièrement rouge ferrugineux, avec les cuisses et l'abdomen un peu plus foncés.

*Calleida Splendida* (GORY, Brésil intérieur), du cabinet de M. Gory.

(Long. 4 lign.  $\frac{1}{4}$ , larg. 1 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Cyanea, capite thoraceque viridibus, elytris sulcatis, truncatis.*

Tête ovale, un peu rétrécie postérieurement, corselet arrondi antérieurement sur ses côtés, coupé carrément à sa base; les angles postérieurs relevés; ridé transversalement, avec une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu; écusson petit, aigu.

Elytres allongées, presque parallèles, arrondies à la base, tronquées à l'extrémité, striées; palpes, mandibules et tarses noirs; les trois premiers articles des antennes fauves, le reste noir.

Tête et corselet vert brillant, élytres et dessous du corps d'un beau bleu.

Cette espèce a été rapportée par M. Saint-Hilaire.

*Plochionus Boisduval* (BUQUET, Sénégal), du cabinet de M. Buquet.

(Long. 3 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 2 lign.)

*Testaceus, elytris striatis.*

Cet insecte ressemble au *Plochionus Bonfilsii* de M. le comte Dejean, il en diffère cependant par la taille qui est plus petite et les élytres qui sont plus tronquées obliquement à l'extrémité.

Tête triangulaire, peu avancée, lisse, avec deux impressions longitudinales entre les yeux.

Antennes presque aussi longues que la tête et le corselet réunis.

Corselet plus large que la tête, presque carré, avec ses angles antérieurs arrondis et sa base coupée carrément; les bords latéraux fortement déprimés, surtout vers les angles postérieurs; une ligne longitudinale dans son milieu et de petites stries transversales. Ecusson triangulaire.

Elytres beaucoup plus larges que le corselet, peu allongées, arrondies à la base, fortement tronquées obliquement à l'extrémité, striées et lisses.

Entièrement rouge ferrugineux, avec la tête plus foncée.

*Lebia Viard* (GORY, Brésil), du cabinet de M. Gory.

(Long. 3 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 1 lign.  $\frac{3}{4}$ .)

*Azurea*, capite, thorace, abdomine, pedibusque rufis; antennis, femoribus apice nigris.

Tête presque triangulaire, un peu rétrécie postérieurement, plane, avec deux impressions ponctuées près des yeux.

Corselet court, plus large que long, presque carré et légèrement rebordé; les angles antérieurs très arrondis; les postérieurs coupés carrément et très relevés; il est un peu convexe, et le milieu de sa base est très peu prolongé; une petite ligne longitudinale enfoncée au milieu et une forte impression transversale à sa base qui sépare la partie qui se prolonge.

Ecusson triangulaire, petit.

Elytres très finement ponctuées, beaucoup plus larges

que le corselet, ayant presque la forme d'un carré long, leurs angles arrondis, et leur extrémité tronquée un peu obliquement.

Tête, corselet, dessous du corps, cuisses jaune foncé; antennes et pattes noires; élytres bleu d'azur.

Je dois cette jolie espèce à la générosité de M. Viard, auquel je l'ai dédiée.

*Lebia Elegans* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

*Lebia Azureipennis* ? Dej. catal., pag. 9.

*Flava, elytris costati cyaneis, profunde sulcatis.*

Tête ovale, peu rétrécie postérieurement, légèrement granulée entre les yeux, ceux-ci gris et assez gros.

Corselet court, transversal, plus large que la tête, ayant ses bords latéraux relevés.

Elytres sillonnées, plus larges que le corselet, arrondies à leur base, s'élargissant, coupées obliquement à leur extrémité.

Tête, antennes, corselet, dessous du corps, et cuisses jaune pâle, avec les élytres d'un beau bleu; les genoux et les pattes noirs.

Cette jolie espèce, rapportée de Cayenne par M. Lacordaire, est désignée dans son dernier catalogue sous le n. 25.

*Lebia Cæca* (GORY, Brésil), du cabinet de M. Gory.

(Long. 3 lign., larg. 1 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Fulva, elytris striatis, macula nigra cordiformi ad basin elytrorum.*

Tête ovulaire, peu rétrécie postérieurement, avec un enfoncement de chaque côté.

Corselet plus long que large, arrondi, avec des stries transversales à peine visibles, et une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu.

Elytres striées, arrondies à la base et à l'extrémité.

Sur chaque élytre, un large cercle oblong qui occupe depuis la partie humérale, jusque passé le milieu, en joignant la suture. Ce cercle est irrégulier; entièrement fauve, avec le cercle noir.

Je dois cette espèce à la générosité de M. Chevrolat.

*Lebia Nigro-maculata* (GORY, Carthagène), du cabinet de M. Gory.

(Long. 2 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Pallida, elytris striatis, duabus maculis nigris.*

Tête lisse, avec quelques légères rides entre les yeux.

Corselet arrondi, avec ses bords latéraux très relevés et une ligne longitudinale dans son milieu.

Écusson très petit, triangulaire.

Elytres striées, allongées, arrondies à leur extrémité, avec deux taches : la première, grande et irrégulière, est autour de l'écusson, la seconde, transversale vers les deux tiers de leur longueur, se dilate sur la suture.

Entièrement jaune testacé, avec les deux taches noires.

Cette espèce a été envoyée par M. Lebas, et portait le numéro 804, dans son catalogue.

*Lebia Pallipes* (GORY, Carthagène), du cabinet de M. Gory.

(Long. 2 lign., larg. 1 lign.)

*Testacea, capite, macula cordiformi ad basin elytrorum, altera postica irregulari ad marginem divergente suturaque nigris.*

Tête convexe, plane, couverte de stries longitudinales très serrées; corselet arrondi, très finement ponctué, une petite ligne longitudinale enfoncée dans son milieu, ayant ses bords latéraux très relevés.

Elytres striées, plus larges que le corselet, arrondies à la base, légèrement tronquées à l'extrémité. A leur naissance, et au-dessous de l'écusson, il y a une large tache cordiforme commune aux deux, suivant la suture, et se réunissant vers les deux tiers à une autre tache qui va en diminuant et en zigzag vers le bord externe.

Entièrement jaune pâle, excepté la tête et les taches qui sont noir mat.

*Coptodera Flavo-signata* (GORY, Sénégal), du cabinet de M. Gory.

(Long. 4 lign. 2, larg. 3 lign.)

*Capite thoraceque nigro-piceis; elytris nigris, striatis, maculis duabus flavis.*

Tête assez grande, triangulaire, couverte de petits points enfoncés assez marqués, et de rides irrégulières.

Corselet plus large que long, arrondi, coupé carrément postérieurement, avec les bords latéraux relevés, et une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu; il est lisse.

Elytres légèrement striées, avec de petits points enfoncés et serrés dans chaque strie, à-peu-près le double plus larges que le corselet, assez allongées, presque parallèles, presque planes et arrondies à leur extrémité.

Sur chaque, deux taches : la première, presque arrondie, touche à l'angle huméral et n'atteint pas la suture; la seconde, placée près de l'extrémité, part de la suture et s'étend entre la quatrième et la cinquième stries; ces taches, les palpes et les antennes fauve foncé, tout le reste du corps, noir brillant.

*Coptodera Viridipennis* (GORY, Java), du cabinet de M. Gory.

(Long. 3 lign., larg. 1 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Viridi-cyanea*, capite thoraceque nigris subtilissime striatis, antennis, abdomine pedibusque fulvis.

Tête triangulaire, avec deux sillons longitudinaux assez enfoncés entre les yeux.

Corselet arrondi, finement ponctué, ayant ses bords latéraux relevés, une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu et un large sillon transversal, ponctué un peu en avant du bord postérieur.

Elytres plus larges que le corselet et s'élargissant; carrées à la base, tronquées obliquement à l'extrémité, finement striées, avec quelques gros points seulement du côté externe.

Palpes, antennes, pattes et dessous du corps fauve foncé.

Tête et corselet noirs.

Elytres, vert brillant.

*Coptodera Velox* (LACORDAIRE, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 2 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Fusca; elytris valde striatis, antennis pedibusque ferrugineis.*

Tête avec une forte impression triangulaire entre les yeux, ceux-ci assez gros et gris; corselet bombé, arrondi, avec ses côtés relevés; ses angles antérieurs et postérieurs coupés carrément, une ligne longitudinale dans son milieu, et de chaque côté de sa base une impression bien marquée.

Écusson triangulaire, aigu; élytres fortement striées, les intervalles lisses et une rangée de points enfoncés près du bord externe, elles sont carrées à la base et sinuées légèrement à l'extrémité.

Entièrement brune avec les antennes et les pattes ferrugineuses.

*Coptodera Nigripennis* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 2 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg.  $\frac{3}{4}$  lign.)

*Ferruginea, elytris truncatis nigris, striatis, maculaque ferruginea.*

Tête presque triangulaire, lisse, avec un sillon assez enfoncé près des yeux.

Corselet plus long que large, coupé carrément postérieurement, ayant ses angles légèrement relevés et une ligne longitudinale enfoncée, très peu marquée, dans son milieu; en outre, avec une forte loupe, on voit quelques stries transverses.

Elytres plus larges que le corselet, s'élargissant, coupées carrément à leur extrémité, striées et finement ponctuées. Vers les deux tiers de chaque, et près de la suture, on aperçoit une petite tache fauve.

Elytres, noir brillant, tout le reste du corps fauve.

Cet insecte a été envoyé de Cayenne par M. Lacordaire et désigné, dans son troisième envoi, sous le numéro 16.

*Orthogonius Malabariensis* (GORY, côte de Malabar),  
du cabinet de M. Gory.

(Long. 8 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 4 lign.)

*Piceus, thoracis margine, elytris femoribusque ferrugineis, tarsis pubescentibus, subtilissimè striato punctatis.*

Il est entièrement d'une couleur très luisante; tête avec quelques rides transversales et deux impressions longitudinales entre les yeux.

Corselet transverse, lisse, beaucoup plus large que long, coupé carrément, antérieurement et postérieurement; les angles antérieurs arrondis, les postérieurs carrés; bords latéraux un peu relevés et déprimés, avec deux impressions transverses, l'une après le bord antérieur, l'autre avant la base.

Ecusson petit, triangulaire.

Elytres plus larges que le corselet, parallèles, carrées à

leur base, arrondies à leur extrémité, finement ponctuées et striées; le long du bord externe, une rangée de points plus marqués, et trois gros points sur chaque: le premier est placé à la base, sur la troisième strie; le second au milieu, sur la seconde strie, et le troisième à leur extrémité, sur cette même strie.

Tête et disque du corselet noirâtres, tout le reste du corps couleur de poix, derniers articles des antennes et tarse pubescens.

Ce bel insecte m'a été donné par M. Melly.

*Heluo Heros* (GORY, Brésil), du cabinet de M. Gory.

(Long. 12 lign., larg. 4 lign.)

*Niger, labro subtransverso; thorace brevi, punctato; elytris elongatis, parallelis, punctatostriatis; ore, antennis, tibiis abdomineque postice ferrugineis.*

Lèvre supérieure arrondie, tête plane, très large entre les yeux, très rétrécie postérieurement en forme de col, ponctuée fortement.

Yeux blanc jaune, très saillans.

Corselet plus large que la tête, ponctué, arrondi antérieurement sur les côtés, nullement échancré pour recevoir la tête, brusquement rétréci, cordiforme, avec les angles postérieurs saillans, aigus et relevés; coupé carrément postérieurement; une impression transversale antérieure en arc de cercle, deux longitudinales près des angles postérieurs assez larges et assez profondes; une autre ligne longitudinale enfoncée dans son milieu.

Elytres très allongées, parallèles, arrondies à la base et

à l'extrémité. Sur chacune, sept sillons assez profonds dans le fond desquels on aperçoit une rangée de petits points enfoncés ; sur les sillons, deux rangées de gros points enfoncés assez espacés les uns des autres.

Pattes courtes, très aplaties.

Dessus du corps, noir brillant ; bouche, antennes, dessous du corps, pattes, brun rouge.

*Brachinus Riffaud* (GORY, Egypte), du cabinet de M. Gory.

*Elytris costatis, nigris, puncto humerali, margine laterali, fascia media dentata abbreviata apiceque testaceis.*

Il manque à cette espèce la tête et le corselet, il a été rapporté d'Egypte par le célèbre voyageur, M. Riffaud, à la générosité duquel je la dois.

Elytres sillonnées, arrondies à la base, coupées carrément à l'extrémité, sur chaque élytre, une bande marginale latérale ; à l'angle huméral, une tache descendant un peu, en forme de pointe, et sur le milieu une large bande transverse, irrégulière, plus étroite vers la suture.

Elytres noir mat ; tout le reste jaune pâle.

*Brachinus Cinctus* (GORY, Sénégal), du cabinet de M. Gory.

(Long. 7 lig.  $\frac{1}{2}$ , larg. 4 lig.)

*Testaceus, abdomine nigro, elytris costatis, nigris, parallelis, puncto humerali, margine laterali, fascia media parva, dentata, abbreviata apiceque, testaceis.*

Tête bombée, légèrement ridée ; corselet oblong, coupé

carrément à sa base et à son extrémité; à sa base une impression transverse en forme d'un arc de cercle; sur son milieu une petite ligne longitudinale peu marquée; il est entièrement entouré d'une petite ligne noire, plus apparente à sa partie postérieure.

Elytres allongées, sillonnées, bombées, presque carrées à l'extrémité; sur chaque élytre une raie marginale latérale, qui se termine par un point rond à l'angle huméral; sur le milieu une bande dentée de chaque côté, assez étroite, n'atteignant pas la suture.

Elytres, abdomen et un point au genou de chaque patte noir mat, tout le reste du corps jaune-testacé.

*Brachinus Gory* (BUQUET, Sénégal), du cabinet de M. Buquet.

(Long. 3 lig., larg. 1 lig.)

*Testaceus, elytrorum sutura maculaque postica rotundata fuscis.*

Corselet allongé, cordiforme, ayant ses angles antérieurs arrondis, et les postérieurs un peu saillans et coupés carrément; ligne longitudinale du milieu assez marquée.

Elytres avec des côtes peu senties, plus larges que le corselet, peu allongées, presque arrondies à la base et à l'extrémité.

Entièrement jaune-testacé, avec les yeux, la suture et une tache sur chaque élytre, placée vers l'extrémité, brun-noir.

*Brachinus Leprieur* (BUQUET, Sénégal), du cabinet  
de M. Buquet.

(Long. 1 lig.  $\frac{3}{4}$ , larg.  $\frac{3}{4}$  lig.)

*Testaceus, elytrorum sutura abbreviata tribus maculaque  
fuscis.*

Corselet allongé, cordiforme, avec les angles postérieurs peu saillans, et coupés carrément; ligne longitudinale du milieu peu marquée.

Elytres lisses, plus larges que le corselet, en ovale presque carré, un peu moins larges à la base qu'à l'extrémité, légèrement convexes et coupées carrément à l'extrémité.

Entièrement d'un jaune-testacé; sur chaque élytre trois taches: la première à l'angle huméral, la deuxième, allongée, est vers les deux tiers de l'élytre du côté externe, et la troisième, arrondie, à l'extrémité.

Ces taches sont noires, ainsi que la suture, qui n'atteint ni la base ni l'extrémité.

*Brachinus Galamensis*, (BUQUET, Sénégal), du  
cabinet de M. Buquet.

(Long. 2 lig.  $\frac{7}{4}$ , larg. 1 lig.  $\frac{7}{4}$ .)

*Testaceus; elytrorum sutura lata maculaque magna fuscis.*

Corselet ponctué, en forme de cœur tronqué, peu allongé, la ligne longitudinale du milieu peu marquée.

Elytres lisses, plus larges que le corselet, en ovale

presque carré, un peu convexes et légèrement carrées à l'extrémité.

Sur chaque élytre une grande tache couvrant tout le disque.

Entièrement jaune-testacé, avec la suture et la tache brun-noirâtre.

*Brachinus Brasiliensis* (GORY, Brésil), du cabinet de M. Gory.

(Long. 5 lig.  $\frac{7}{2}$ , larg. 2 lig.)

*Capite, primo articulo antennarum, thorace, scutello pedibusque rufo-ferrugineis, abdomine obscuro, elytris costatis, nigro-viridibus.*

Tête avec quelques petites impressions longitudinales entre les yeux : ceux-ci gris ; deuxième, troisième et quatrième articles des antennes noirs, le reste pubescent.

Corselet allongé, avec ses angles antérieurs très arrondis, ses bords très relevés, ses angles postérieurs saillans, et la base carrée ; une ligne longitudinale peu sentie et quelques petites rides transversales.

Écusson triangulaire.

Elytres carrées à la base, s'élargissant un peu vers l'extrémité, qui est très arrondie ; elles ont des côtes élevées, et les intervalles sont lisses.

Tête, premier article des antennes, corselet, écusson et pattes rouge-ferrugineux ; élytres noir-vert ; dessous du corps obscur.

*Brachinus OEquinocialis* (GORY, Carthagène), du cabinet de M. Gory.

Brach. Lebasii? Dej. catal. p. 12.

(Long. 4 lig.  $\frac{1}{2}$ .)

*Capite, antennis, thorace, scutello, sutura elytrorum, pedibusque rufo-ferrugineis; elytris nigro-viridibus, subcostatis; abdomine obscuro.*

Tête lisse, avec deux fortes impressions entre les yeux : ceux-ci noirs.

Corselet plus long que celui du *Mexicanus*, moins échancré avant ses angles postérieurs, ceux-ci très aigus, les antérieurs arrondis; une ligne longitudinale, très sentie dans son milieu.

Écusson triangulaire, très aigu, avec un point élevé dans son milieu.

Elytres presque parallèles, bombées, très échancrées postérieurement, avec des côtes élevées et les intervalles lisses.

Tête, antennes, corselet, écusson, suture des élytres et pattes rouge-ferrugineux, abdomen obscur, élytres vert-bleu, avec quelques reflets cuivreux.

*Eurydera Spinosa* (GORY, Madagascar), du cabinet de M. Gory.

(Long. 9 lig., larg. 4 lig.)

*Atra, thorace cordato, elytris postice spinosis profunde striatis, externe punctatis.*

Tête ovale, aplatie, quelques rides longitudinales de

chaque côté des yeux, avec une forte impression sur le milieu.

Corselet plus large que long, échancré pour recevoir la tête, ayant ses angles antérieurs arrondis, ceux postérieurs coupés carrément; ses bords latéraux très relevés; de chaque côté de ses angles postérieurs une forte impression, une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu, et de petites rides transversales sur toutes ses parties.

Elytres au moins une fois plus larges que le corselet, arrondies à la base et à l'extrémité, épineuses à la suture; elles sont striées, et ont, le long de chaque côté externe, une rangée de gros points enfoncés; leurs bords très relevés.

Entièrement brun-noir.

Cette espèce m'a été donnée par M. Latreille.

*Eurydera Flavicornis* (GORY, Madagascar), du cabinet de M. Gory.

(Long. 6 lig., larg. 3 lig.)

*Atra, elytris rotundatis, subtilissime striatis, postice spinosis maculaque flava, antennis fulvis.*

Tête assez large, rétrécie en arrière.

Corselet plus large que la tête, antérieurement aplati, en forme de cœur, tronqué carrément en arrière, bords latéraux très relevés, une forte impression de chaque côté des angles postérieurs, une ligne longitudinale, enfoncée dans son milieu, et de petites rides transversales dans toutes ses parties.

Elytres striées, très larges, ovales, ayant leurs côtés ex-

ternes relevés, tronquées antérieurement, arrondies à l'extrémité, épineuses à la suture; cette épine droite.

Sur chaque élytre une tache irrégulière couleur d'orange, placée sur le disque et touchant la suture.

Antennes et dessous des pattes fauves; entièrement brun-noir.

Cet insecte est méplat: je crois cette forme propre au genre.

Je dois cette espèce à la générosité de M. Desmarest.

*Catascopus Rufipes* (BUQUET, Sénégal), du cabinet de M. Buquet.

(Long. 4 lig.  $\frac{7}{8}$ , larg. 1 lig.  $\frac{1}{2}$ .)

*Viridi-cyaneus*, *elytris striato-punctatis*; *antennis*, *abdomine pedibusque ferrugineis*.

Tête finement ridée, allongée, rétrécie postérieurement, avec un sillon longitudinal de chaque côté, près des yeux, et une impression transversale derrière; yeux très saillans.

Corselet plus large que la tête à sa partie antérieure, plus étroit à sa base, presque en forme de cœur tronqué, bords relevés; une ligne longitudinale bien marquée dans son milieu, fortement ridé, et deux impressions transversales peu marquées.

Ecusson lisse, petit, triangulaire.

Élytres beaucoup plus larges que le corselet, assez allongées, presque parallèles, tronquées obliquement et échancrées à l'extrémité, striées et fortement ponctuées; avec trois points enfoncés distincts, entre la troisième strie.

Dessus du corps bleu-verdâtre, dessous noir; extrémité de l'abdomen et pattes rouge-ferrugineux.

*Catascopus Madagascariensis* (GORY, Madagascar),  
du cabinet de M. Gory.

(Long. 4 lig.)

*Ore, antennis, margine thoracis, pedibusque ferrugineis, capite, thorace, elytrisque nigro-viridibus; elytris costatis, truncatis externe punctatis.*

Tête large, aplatie, finement ridée entre les yeux; ceux-ci saillans.

Corselet coupé carrément à son bord antérieur; ses angles antérieurs très arrondis, ses bords relevés, déprimés; rétréci un peu avant ses angles postérieurs, qui sont carrés et aigus; sa base carrée; trois impressions longitudinales, une de chaque côté des bords et une dans son milieu; deux transversales, une après le bord antérieur, l'autre avant sa base.

Elytres avec des côtes élevées, carrées à la base, échancrées à l'extrémité; de chaque côté de l'échancrure une épine; un point placé sur la troisième côte, et une rangée de plus gros le long de chaque bord externe.

Bouche, antennes, marge du corselet et pattes, ferrugineux; tête, corselet, élytres noir-vert.

*Graphipterus Arcuatus* (GORY, Cap de Bonne-Espérance), du cabinet de M. Gory.

(Long. 7 lig., larg. 3 lig.)

*Niger; thoracis margine albida; elytris albidis, sutura lineaque interrupta, arcuata, nigris.*

Il ressemble beaucoup au *Trilineatus*; mais il est plus grand; le corselet plus étroit à sa base, les élytres plus longues, plus arrondies, et enfin la ligne qui est dessus est beaucoup plus étroite et interrompue.

Tête assez forte, bombée, ponctuée, avec une carène de chaque côté, qui longe les yeux.

Corselet en cœur, très rétréci postérieurement; son bord antérieur très peu sinué, et la base nullement échancrée.

Ecusson petit, triangulaire, fortement ponctué.

Elytres ovales, très arrondies à leur extrémité.

Sur la tête une large bande longitudinale.

Sur le corselet une large bande longitudinale, se rétrécissant postérieurement.

Sur chaque élytre une ligne longitudinale, ne touchant ni la base ni l'extrémité; cette ligne est interrompue dans son milieu, en forme de crochet; il y en a une autre le long de la suture, qui se diminue tellement vers les deux tiers qu'elle devient presque invisible.

Toutes ces bandes, lignes, et tout le reste du corps noir-mat; tandis que ce qui reste à découvert de la tête, du corselet et des élytres, est parsemé de petits poils si serrés que ces parties paraissent blanc-jaunâtre.

*Graphipterus Obscurus* (HOPE, Caffrerie), du cabinet de M. Gory.

( Long. 5 lig., larg. 2 lig.  $\frac{1}{2}$ .)

*Niger, elytris albis, vitta nigra.*

Tête assez avancée, plane, ponctuée.

Corselet beaucoup plus large que long, en forme de croissant, le bord antérieur très échancré ; les angles postérieurs arrondis.

Elytres très courtes, arrondies à la base et à l'extrémité.

Je ne possède qu'un individu fort mal conservé de cet insecte ; je crois cependant qu'il existe sur le corselet une bande longitudinale dans son milieu.

Sur chaque élytre une bande large, longitudinale sur son milieu, l'occupant dans toute sa longueur.

Les deux premiers articles des antennes fauves, les autres plus foncés.

Corselet et élytres couverts d'un duvet blanchâtre ; le reste du corps, avec les lignes du corselet et des élytres, noir mat.

Je dois cette espèce à la générosité de M. Hope, entomologiste anglais, qui possède une magnifique collection.

*Scarites Doguerau* ( GORY, Cap de Bonne-Espérance ), du cabinet de M. Gory.

( Long. 18 lig., larg. 6 lig. )

*Niger; tibiis anticis dentatis, postice bidenticulatis; elytris oblongo-ovatis, striatis, striis lævigatis, punctoque postico impresso.*

Tête grande, presque carrée et assez plane ; avec de fortes

rides longitudinales antérieurement; presque lisse près du corselet, et deux fortes impressions qui partent de la lèvre supérieure, et s'arrêtent à la hauteur des yeux; lèvre supérieure fortement sillonnée, avec trois petites dents; mandibules aussi longues que la tête, fortement ridées dans toute leur longueur, avec trois lignes très élevées; la mandibule droite a trois dents: celle de gauche n'en a que deux.

Corselet plus large que long, très échancré antérieurement, un peu prolongé au milieu de la base, et légèrement sinué; avec une petite échancrure de chaque côté, au point correspondant à l'angle postérieur; il a une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu, une autre transversale, parallèle au bord antérieur, et des stries longitudinales très serrées entre cette ligne et le bord antérieur; il y en a également de transversales des deux côtés du corselet, avec une forte impression de chaque côté, vis-à-vis le prolongement de sa base; les bords latéraux et la base sont fortement relevés.

Ecusson assez grand, triangulaire, échancré dans son milieu, fortement ridé à sa partie antérieure, lisse à sa partie postérieure.

Elytres striées, aussi larges que le corselet, bombées, arrondies à l'extrémité, légèrement granulées le long du bord externe, avec un point distinct sur la troisième strie, du côté de la suture, près de l'extrémité; leur base est un peu sinuée, avec un petit rebord en forme d'épine à leur partie humérale.

Jambes antérieures avec trois fortes dents extérieures et une petite échancrure au-dessus de la dernière dent.

Entièrement noir lisse.

*Scarites Hope* (GORY, Cap de Bonne - Espérance),  
du cabinet de M. Gory.

(Long. 14 lig., larg. 4 lig. o.)

*Niger; tibiis anticis tridentatis, elytris ovatis subconvexis, subtilissime punctatis, punctisque duobus posticis impressis.*

Mandibules presque aussi longues que la tête avec deux lignes élevées dessus, ce qui les fait paraître creusées, avec deux fortes dents.

Lèvre supérieure fortement ridée, terminée par trois dents.

Tête large, carrée, ridée longitudinalement à sa partie antérieure ainsi que près des yeux, lisse à sa postérieure; elle a deux fortes impressions longitudinales, qui partent de la ligne transversale qui est après la lèvre supérieure et qui vont jusqu'à la hauteur des yeux.

Corselet aussi large que long, échancré antérieurement, arrondi postérieurement, un peu sinué dans le milieu de sa base; il a une petite dent de chaque côté, au point correspondant à l'angle postérieur; une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu et une autre transversale, parallèle au bord antérieur; on aperçoit entre cette ligne transversale et le bord antérieur, des stries longitudinales très peu marquées.

Élytres lisses, allongées, arrondies à l'extrémité, la base forme un angle peu saillant de chaque côté; les bords externes peu rebordés et légèrement granulés; trois dents extérieures aux pattes antérieures; sur chaque élytre, à l'extrémité et près la suture, deux gros points enfoncés.

Entièrement noir lisse; toutes les pattes couvertes de poil roux.

*Clivina Striatipennis* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 2 lig.  $\frac{1}{2}$ , larg.  $\frac{3}{4}$  lig.)

*Brunnea, elytris elongato-ovatis, profunde striato-punctatis; antennis pedibusque rufis.*

Tête petite, presque triangulaire, avec une forte impression de chaque côté, près des yeux.

Corselet globuleux, lisse.

Elytres striées, très fortement ponctuées, plus larges que le corselet; coupées carrément à la base, arrondies à l'extrémité.

Brun-rouge foncé, antennes et pattes ferrugineuses.

Cet insecte a été trouvé par M. Lacordaire, et désigné dans son second catalogue, sous le numéro 24.

*Carabus Prevost* (GORY, Sibérie), du cabinet de M. Gory.

(Long. 13 lig., larg. 5 lig.)

*Oblongo-ovatis; niger, elytris oblongis, granulatis.*

Tête grosse, avancée, ridée, surtout à sa partie antérieure.

Corselet plus large que la tête, plus long que large, un peu arrondi sur les côtés, couvert de petites rides transversales; une ligne longitudinale enfoncée, très peu mar-

quée dans son milieu, une impression de chaque côté, vers l'angle postérieur, peu marquée; échancré antérieurement, les bords latéraux rebordés, relevés vers les angles postérieurs; ceux-ci peu prolongés en arrière, et formant un angle très peu sensible avec la base, qui paraît presque échancrée en arc de cercle.

Ecusson large, court, triangulaire, avec deux petites impressions.

Elytres très finement granulées, très allongées, arrondies à la base et à l'extrémité, s'élargissant dans leur milieu; les bords externes relevés.

Entièrement noir; avec les sept derniers articles des antennes pubescens.

*Carabus Carcel* (DELAPORTE, Smyrne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 12 lign., larg. 4 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Ovatus, niger, thorace brevi, largo, elytris ovatis convexis, granulatis, punctisque obsoletis impressis, triplici serie.*

Il ressemble, à la première vue, au *Græcus* de M. le comte Dejean, mais il en diffère par le corselet qui est plus court et plus large; par les élytres plus longues, plus bombées et surtout plus rétrécies à l'extrémité, et par la granulation des élytres qui sont couvertes de points enfoncés dans le *Græcus*.

Tête fortement chagrinée.

Corselet court, plus large que long, fortement granulé, avec une petite ligne longitudinale enfoncée dans son milieu, les bords latéraux peu relevés, sa partie antérieure coupée carrément, les angles postérieurs peu relevés, peu

prolongés en arrière, ce qui fait paraître la base très peu échancrée.

Elytres allongées, bombées, arrondies à la base avec le bord externe relevé, pointues à l'extrémité, elles sont fortement granulées, avec trois rangées de points enfoncés très peu marqués.

Entièrement noir mat.

Je possède mâle et femelle de cette espèce qui m'a été donnée par M. Delaporte.

*Omophron Capense* (GORY, cap de Bonne-Espérance),  
du cabinet de M. Gory.

(Long. 2 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 1 lign.  $\frac{3}{4}$ .)

*Pallido testaceum, capite postico, thoracis macula media viridi auratis; elytrorum sutura fusca.*

Cet insecte est de forme plus arrondie que ceux de ce genre.

Corselet fortement ponctué, avec ses bords antérieurs très saillans et baissés, sa base un peu prolongée sur l'écusson.

Elytres très arrondies, un peu plus larges que le corselet, fortement striées et ponctuées. Sur la partie antérieure de la tête, une tache triangulaire argentée.

Bords latéraux du corselet, argentés, ainsi qu'une ligne qui borde extérieurement les élytres; le reste de la tête et du corselet, vert doré; sur les élytres, une grande tache irrégulière brune.

Tout le reste de l'insecte, pâle testacé.

*Panagæus Regalis* (GORY, Sénégal), du cabinet de  
M. Gory.

(Long. 12 lign., larg. 4 lign.)

*Ater, thorace rotundato profunde punctato, elytris sulcatis, maculis sub quadratis duabus flavis.*

Tête fortement ponctuée, avec une forte impression de chaque côté près des yeux.

Corselet rond, légèrement échancré antérieurement, prolongé à sa base, qui est coupée carrément, une petite échancrure à ses angles postérieurs; ses bords latéraux très largement relevés, il est couvert de très gros points enfoncés, avec une impression longitudinale dans son milieu.

Elytres bombées, allongées, arrondies à la base et à l'extrémité, fortement sillonnées et ponctuées.

Sur chaque élytre, une bande et une tache jaunes.

La bande qui n'atteint ni le bord externe, ni la suture, est transverse et placée vers le tiers de sa longueur, la tache est également transverse, un peu échancrée et n'atteint ni le bord externe ni la suture, elle est placée presque à son extrémité.

Entièrement noir.

Ce bel insecte se trouvait dans une collection du Sénégal que j'ai achetée en 1829.

*Panagæus Myops* (GORY, Sénégal), du cabinet de  
M. Gory.

(Long. 8 lign., larg. 3 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Ater, elytris punctato-striatis, macula postica testacea.*

Tête plus fortement ponctuée à sa base.

Corselet arrondi, coupé droit à ses parties antérieure et postérieure, fortement ponctué, avec une ligne longitudinale assez marquée dans son milieu, et de chaque côté près des angles postérieurs, une forte impression longitudinale.

Ecusson court, triangulaire.

Elytres presque carrées à la base, arrondies à l'extrémité, bombées, striées et ponctuées; les côtes des stries sont également ponctuées.

Sur chaque élytre, une grande tache jaune irrégulière, placée presque à l'extrémité.

Entièrement noir, légèrement pubescent en-dessus avec le bord externe des élytres verdâtre.

Ce bel insecte se trouvait dans une collection du Sénégal, que j'ai achetée en 1829.

*Panagæus Vicinus* (GORY, Brésil), du cabinet de M. Gory.

(Long. 3 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 1 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Ater, elytris rufis, basi, fascia media apiceque nigris.*

Il ressemble un peu au Crux-Major de Fabr., mais il en diffère par le prolongement du corselet qui est plus rétréci postérieurement; cette espèce est aussi voisine du Fasciatus de Say.

Tête lisse, avec une ligne ponctuée de chaque côté des yeux, et une transverse, élevée, près du col.

Corselet arrondi, rétréci postérieurement, un peu prolongé et la base coupée carrément, entièrement couvert de poils longs et serrés, roussâtres.

Ecusson petit, triangulaire, fortement ponctué, ce qui le fait paraître creusé dans son milieu.

Elytres plus larges que le corselet, presque parallèles,

allongées et arrondies à l'extrémité, striées et fortement ponctuées à la base, une tache commune arrondie, une bande transversale plus large que dans le Crux-Major qui ne va pas tout-à-fait au bord externe, cette bande s'élargit sur la suture, et une autre tache à l'extrémité commune aux deux élytres qui sont couvertes de longs poils assez espacés.

La tache de la base, la bande transversale et la tache de l'extrémité noires.

Entièrement noir; élytres rouge ferrugineux avec les taches de la base, de l'extrémité et la bande transversale noires.

Cet insecte vient du Brésil.

*Callistus Quadri-pustulatus* (GORY, cap de Bonne-Espérance), du cabinet de M. Gory.

(Long. 2 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 1 lign.)

*Ater, thorace rubro, elytris macula duabusque albo-tomentosis.*

Lèvre supérieure courte, transversale et peu échancrée, mandibules peu avancées, arquées, étroites et très aiguës; palpes peu saillans, dernier article assez allongé, ovalaire et presque terminé en pointe.

Tête triangulaire, fortement ponctuée.

Corselet arrondi, presque en forme de cœur, finement ponctué, avec une petite ligne longitudinale peu enfoncée dans son milieu; ses angles postérieurs un peu relevés avec une forte impression de chaque côté, il est légèrement échancré à sa partie antérieure et coupé carrément à sa base.

Elytres presque en ovale allongé, stries très finement ponctuées.

Sur chaque élytre, deux petites taches transversales, la première, placée plus du côté externe que de la suture et presque au tiers de sa longueur, la seconde, un peu plus large, sur une ligne perpendiculaire à la première, et vers les trois quarts de sa longueur.

Noir mat.

Sur la tête, une large tache d'un beau bleu.

Corselet rouge, taches des élytres et des pattes, blanc sale.

Jusqu'à présent on ne connaissait que deux espèces dans ce genre; j'ai reçu cette jolie petite du Cap où elle a été trouvée par les fils Verreaux.

*Chlœnius Opulentus* (DUPONT, Sénégal), du cabinet de M. Reiche.

(Long. 7 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 3 lign.)

*Viridi-cæneus, capite thoraceque ovato, elytris profunde striatis, striis punctatis, sutura lata obscuriori, antennis pedibusque flavis.*

Il ressemble beaucoup, à la première vue, au Splendidus de Dejean, la couleur des élytres est d'un vert bronzé moins clair, moins brillant et moins doré; la tête est plus large, le corselet plus rétréci et plus déprimé postérieurement.

Tête allongée, large, non rétrécie postérieurement, assez fortement ponctuée et deux impressions longitudinales bien marquées entre les yeux, ceux-ci bruns.

Corselet ponctué, un peu plus large que la tête, plus

long que large, les angles antérieurs arrondis, ceux postérieurs aigus; les côtés un peu déprimés; une ligne dans son milieu, une forte impression longitudinale de chaque côté de la base, et une transversale un peu au-dessus.

Écusson lisse, petit, triangulaire.

Élytres convexes, plus larges que le corselet, allongées, presque parallèles, carrées à la base, arrondies à l'extrémité, stries assez fortement marquées et finement ponctuées, sur la dernière du côté externe, on voit des points plus forts.

Tête, corselet, élytres vert bronzé, avec quelques reflets dorés, écusson noir, suture des élytres, noirâtre, antennes et pattes, jaune très pâle, dessous du corps brun, un peu moins foncé à l'abdomen.

*Chlœnius Guérin* (GORY, Sénégal), du cabinet de  
M. Gory.

(Long. 9 lign., larg. 4 lign.)

*Capite thoraceque viridi-æneis, nitidis, elytris pubescentibus subtilissime striatis, margine fascia transversa pone medium, puncto postico, antennis pedibusque testaceis.*

Tête non rétrécie postérieurement, avec des points enfoncés peu rapprochés, et quelques rides longitudinales de chaque côté des yeux.

Corselet plus large que la tête, arrondi sur les côtés, presque plane, couvert de points enfoncés assez espacés les uns des autres; sur le milieu, une petite ligne longitudinale enfoncée à peine sentie, et de chaque côté de sa base une forte impression; très légèrement échancré à la

partie antérieure et coupé carrément à sa base, les angles antérieurs arrondis et baissés, ce qui le fait paraître bombé antérieurement; ceux postérieurs peu arrondis.

Ecusson petit, triangulaire, aigu.

Elytres finement striées, plus larges que le corselet, en ovale allongé, rétrécies à l'extrémité qui est presque terminée en pointe; elles sont couvertes d'un duvet si serré, que l'on n'aperçoit pas la couleur du fond, ce qui les fait paraître pubescentes.

Sur chaque élytre, une bande marginale latérale qui, se dilatant au milieu, forme une tache de forme ronde qui s'étend jusque vers la troisième strie, cette bande est plus large depuis la partie humérale jusqu'à la tache, que depuis la tache à l'extrémité, une autre petite tache un peu avant l'extrémité.

Tête, corselet, vert brillant, élytres vertes, pubescentes, lèvres, palpes, antennes, bandes, taches, pattes et abdomen, jaune testacé.

Je dois cette belle espèce à la générosité de M. Guérin, auquel je l'ai dédié.

*Chloenius Mirabilis* (BUQUET, Sénégal), du cabinet de M. Buquet.

(Long. 9 lign., larg. 3 lign.  $\frac{3}{4}$ .)

*Capite thoraceque viridi-cupreis, punctatis, elytris nigris, striatis, interstitiis punctatis, margine lato, maculis duabus margine coherentibus pedibusque flavis; antennis basi rufo-testaceis.*

Tête ponctuée, presque triangulaire, non rétrécie postérieurement.

Corselet presque arrondi, cependant un peu plus long que large, fortement ponctué avec une ligne longitudinale peu marquée dans son milieu et une impression de chaque côté de la base.

Elytres plus larges que le corselet, en ovale allongé, convexes.

Sur chaque élytre, une large bordure latérale plus dilatée à l'angle huméral avec deux taches qui joignent cette bordure et placées ainsi : la première, sur le milieu et la deuxième un peu avant l'extrémité.

Antennes noires avec les trois premiers articles ferrugineux ; tête, corselet vert foncé, chatoyant en cuivreux.

Elytres et dessous du corps, noir, bordure, taches et pattes, jaune d'ocre.

*Chlœnius Ernest* (BUQUET, Sénégal), du cabinet de  
M. Buquet.

(Long. 6 lign., larg. 2 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Capite viridi-æneo, elytris nigro-piceis, margine, maculis duabus margine cohærentibus, antennis, thorace pedibusque flavis.*

Cette espèce ressemble un peu à l'*Eximius* de M. le comte Dejean ; mais le corselet en est moins large et la forme et la disposition des taches des élytres ne sont plus les mêmes.

Tête petite, triangulaire, couverte de petits points enfoncés.

Corselet légèrement pubescent et couvert de petits points serrés très enfoncés, plus large que la tête, plus long que large, arrondi sur les côtés, presque plane, ligne longitu-

dinale fine et assez marquée, le bord antérieur échancré et les angles postérieurs arrondis.

Elytres plus larges que le corselet, en ovale allongé, pubescentes et convexes.

Sur chaque élytre, une large bordure qui, se dilatant en-dessus, forme deux taches placées ainsi : la première à l'angle huméral, la deuxième un peu plus bas que les deux tiers de l'élytre, est irrégulière, transversale et n'atteint pas la suture.

Tête verte ; lèvres supérieure, palpes, antennes, corselet, bordure, taches et pattes, jaune citron.

Elytres et dessous du corps noir ; le noir des élytres se prolonge sur le milieu du corselet et y forme une tache carrée.

*Chlœnius Porcatus* (GORY, Indes-Orientales),  
du cabinet de M. Gory.

(Long. 7 lig., larg. 2 lig.  $\frac{3}{4}$ .)

*Niger, thorace punctato, elytris sulcatis, macula duabusque testaceis.*

Tête ponctuée, avec une forte impression longitudinale de chaque côté.

Corselet beaucoup plus large que la tête, surtout à sa partie postérieure, qui l'est presque autant que les élytres, coupé carrément à sa partie antérieure et à sa base, ayant ses bords latéraux très relevés ; surtout aux angles postérieurs qui sont peu arrondis, ceux antérieurs le sont beaucoup ; couvert entièrement de gros points enfoncés, très serrés, ce qui le fait paraître rugueux ; une petite ligne

longitudinale enfoncée, dans son milieu, et une forte impression de chaque côté de sa base.

Elytres un peu plus larges que le corselet, parallèles, arrondies à l'extrémité; fortement striées et finement ponctuées; les troisième, cinquième et septième stries beaucoup plus saillantes et lisses.

Sur chaque élytre deux petites taches jaunes, placées sur son milieu, celle du côté de la suture un peu plus forte.

Entièrement noir.

*Chloenius Max* (GORY, Sénégal), du cabinet de M. Buquet.

(Long. 4 lig., larg. 1 lig.  $\frac{2}{3}$ .)

*Capite, elytris nigris, thorace margine, macula postica pedibusque flavis.*

Tête petite, rétrécie postérieurement, très finement ponctuée.

Corselet aussi large que long, arrondi, ponctué, avec une ligne longitudinale enfoncée, dans son milieu.

Elytres striées, ponctuées, allongées, presque parallèles.

Sur chaque élytre une bordure et une tache irrégulière, presque à l'extrémité.

Tête, élytres, dessous du corps, noir; antennes, lèvre supérieure, bordure, tache et pattes jaune-pâle.

*Chlænius Brunet* (BUQUET, Sénégal), du cabinet de M. Buquet.

(Long., 5 lig.  $\frac{1}{2}$ , larg. 2 lig.)

*Nigro-cæruleus, elytris subtilissime, striatis, punctatis, macula, antennæ basi pedibusque flavis.*

Tête assez large, triangulaire, avec quelques points enfoncés près des yeux.

Antennes noires, excepté les trois premiers articles, ferrugineux.

Corselet ponctué, arrondi antérieurement, rétréci postérieurement; les angles postérieurs obtus, base coupée carrément, avec une ligne longitudinale, peu marquée dans son milieu, et une forte impression de chaque côté de la base.

Elytres beaucoup plus larges que le corselet, bombées, arrondies à l'extrémité.

Sur les élytres une bande qui n'atteint pas l'extrémité, en forme de fer à cheval, dont les pointes remontent et vont jusque vers leur milieu.

Entièrement vert bleu, excepté la bande et les pattes, fauve.

*Chlænius Gory* (BUQUET, Sénégal), de la collection de M. Buquet.

(Long. 5 lig.  $\frac{1}{4}$ , larg. 1 lig.  $\frac{1}{4}$ .)

*Viridi-cæneus, thorace oblongo profunde punctato; elytris striatis, interstitiis punctatis, macula ovata postica; antennarum basi pedibusque testaceis.*

Au premier coup-d'œil cette espèce pourrait être regardée

comme un petit individu de l'espèce que M. le comte Dejean a nommée *Myops* ; mais en la comparant, on s'aperçoit promptement qu'il n'y ressemble que par la disposition des taches, qui sont à-peu-près les mêmes.

Tête petite, triangulaire, rétrécie postérieurement.

Corselet oblong, couvert de points très serrés et fortement enfoncés, la ligne longitudinale du milieu très peu marquée, et une impression longitudinale peu marquée de chaque côté de la base; le bord antérieur coupé carrément; les côtés rebordés, un peu relevés, surtout vers ses angles postérieurs, qui sont coupés carrément, mais ayant leur sommet assez arrondi.

Elytres allongées, convexes, ovalaires, striées, avec les intervalles finement ponctués.

Sur chaque élytre, et un peu avant l'extrémité, une tache ovale.

Cette tache et les pattes, jaune-testacé.

*Chloenius Leprieur* (BUQUET, Sénégal), du cabinet de M. Buquet.

(Long. 6 lig., larg. 2 lig. o.)

*Capite thoraceque viridi-æneis; thorace punctato; elytris obscuro-viridi-æneis, pubescentibus, striatis, interstitiis subtilissime punctatis; margine, antennis pedibusque flavo-pallidis.*

Cette espèce me paraît être intermédiaire entre le *Cinctus* de Herbst et celui d'Olivier.

Tête triangulaire, ponctuée, avec une forte impression longitudinale de chaque côté des yeux.

Corselet couvert de points très serrés, arrondi, avec

deux impressions transversales et une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu, et un enfoncement longitudinal de chaque côté de la base, les bords relevés, les angles postérieurs aigus, et un peu prolongés sur les élytres.

Ecusson triangulaire, ponctué.

Elytres allongées, presque parallèles, striées, légèrement ponctuées dans les intervalles.

Sur chaque élytre une bordure.

Antennes, bordure et pattes fauve-pâle.

*Chlœnius Auricollis* (GRY, Cap de Bonne-Espérance),  
du cabinet de M. Gory.

(Long. 4 lig. o., larg. 2 lig. o.)

*Capite thoraceque aurato-viridis; thorace angustato punctis sparsis impressis; elytris nigris, striatis, ore antennis pedibusque pallide flavis.*

Cet insecte ressemble un peu au *Chlœnius Cylindricollis* de Klug; mais il en diffère par le corselet, qui est moins bombé, moins rétréci postérieurement; les élytres, qui n'ont point de bandes marginales latérales.

Tête avec quelques petites rides, une rangée transversale de points enfoncés au-dessus des yeux, et une impression de chaque côté, près de l'insertion des antennes.

Corselet très allongé, de la largeur de la tête à sa partie antérieure, s'élargissant sur les côtés, qui sont rebordés; les angles postérieurs coupés carrément, la base échancrée dans son milieu, et les angles antérieurs arrondis et contournant le col.

La ligne longitudinale qui est dans son milieu est assez sentie, ainsi que l'impression longitudinale de chaque côté

de la base, près des angles postérieurs; sur le dessus quelques petites rides transverses et quelques points enfoncés.

Elytres beaucoup plus larges que le corselet, striées, allongées; arrondies à l'extrémité; le long du bord externe des points enfoncés.

Tête, corselet, vert-doré très brillant.

Bouche, antennes et pattes jaune-pâle; élytres et dessous du corps; noir-vert, avec le bord externe des élytres d'un vert moins noir.

*Chlœnius Algerinus* (GORY, Alger), du cabinet de M. Gory.

(Long. 7 lig. larg. 2 lig.  $\frac{3}{4}$ .)

*Viridi-obscurus, capite thoraceque viridi-cupreis, elytris striatis subtilissime punctatis.*

Cet insecte est généralement méplat.

Tête rétrécie postérieurement, finement ponctuée avec de petites stries transversales.

Corselet plus large que la tête, presque en forme de cœur, très échancré à sa partie antérieure, coupé carrément à sa base; les angles antérieurs et postérieurs aigus, les bords externes peu relevés; fortement ponctués, une ligne longitudinale enfoncée, bien sentie dans son milieu, et une forte impression longitudinale de chaque côté de la base, près de l'angle postérieur.

Ecusson court, triangulaire.

Elytres plus larges que le corselet, en ovale allongé, arrondies à l'extrémité; striées et très finement ponctuées; les bords externes un peu relevés.

Tête, corselet vert-cuivreux.

Mandibules, palpes, les trois premiers articles des antennes brun-rouge très foncé, les autres pubescens.

Ecusson, dessous du corps et pattes noir-bleu.

Elytres vert-obscur.

Cet insecte a été rapporté d'Alger par le lieutenant-colonel d'état-major Aupik, et m'a été donné par M. le baron de Feisthamel.

*Chlænius Capensis* (GORY, Cap de Bonne-Espérance), du cabinet de M. Gory.

(Long. 6 lig., larg. 2 lig.  $\frac{7}{8}$ .)

*Capite, thoraceque viridi-cæneis nitidis; elytris thalassinis, pubescentibus; striatis circumdatis, margine, antennis pedibusque testaceis.*

Il ressemble beaucoup au Velutinus, mais la marge des élytres est plus étroite; le corselet un peu moins large.

Tête ponctuée, surtout autour des yeux; ceux-ci gris.

Corselet plus large que la tête, plus long que large, ayant ses angles antérieurs très arrondis et baissés, ses angles postérieurs carrés, sa base un peu échancrée; il est ponctué; une ligne longitudinale dans son milieu, qui n'atteint pas le bord antérieur ni la base, et une forte impression de chaque côté de la base.

Ecusson en forme de cœur.

Elytres plus larges que le corselet, oblongues, très arrondies à leur extrémité, striées, les intervalles finement ponctués, et une bande marginale qui les entoure.

Tête et corselet vert-brillant.

Antennes, bande des élytres et pattes jaune-testacé.

Ecusson et élytres vert de mer pubescent.

Dessous du corps noir.

*Chlaenius Marginipennis* (GORY, Cap de Bonne-Espérance), du cabinet de M. Gory.

(Long. 4 lig.  $\frac{3}{4}$ , larg. 1 lig.  $\frac{3}{4}$ .)

*Supra viridi-cæneus nitidus; elytris striatis interstitiis subtilissime punctatis; margine latissimo, antennis pedibusque flavis.*

Cette espèce ressemble à l'*Amictus* d'Illiger, mais il en diffère par la taille, qui est un peu plus petite, la forme du corselet et des élytres.

Tête couverte de petites rides avec deux légères impressions en avant des yeux.

Corselet plus long que large, guère plus large que la tête antérieurement, rétréci postérieurement, ayant ses côtés arrondis; coupés carrément à sa partie antérieure, sa base un peu échancrée dans son milieu, ses angles postérieurs coupés un peu obliquement, ceux antérieurs arrondis et baissés, sur le dessus quelques petits points enfoncés, assez éloignés les uns des autres; la ligne longitudinale enfoncée dans son milieu, très sentie, ainsi que l'impression, de chaque côté de la base, vis-à-vis les angles postérieurs.

Ecusson petit, triangulaire.

Elytres arrondies à la base, s'élargissant, un peu échancrées à l'extrémité; striées et très finement ponctuées, on aperçoit dessus un petit duvet soyeux.

Sur chaque élytre une large bande marginale latérale, plus grande à sa partie postérieure.

Tête, corselet, écusson, élytres, vert-brillant.

Bouche, antennes, bande des élytres et pattes jaune-pâle; dessous du corps, noir.

*Epomis Capensis* (GORY, Cap de Bonne - Espérance),  
du cabinet de M. Gory.

(Long. 9 lig., larg. 4 lig.)

*Niger, elytris profunde striatis, subsulcatis subtilissime punctatis; margine, antennis pedibusque flavis.*

Cet insecte ressemble au *Circumscriptus*, mais il en diffère par la taille, qui est un peu plus petite, et par les élytres, qui sont un peu plus bombées.

Tête ridée et ponctuée.

Corselet plus large que la tête, coupé carrément à la partie antérieure, un peu échancré au milieu de sa base, ayant ses bords relevés, ses angles antérieurs aigus, contournés sur le col, les postérieurs coupés obliquement; sur le dessus quelques points enfoncés; une ligne longitudinale peu sentie dans son milieu, et une forte impression de chaque côté de sa base, près des angles postérieurs.

Elytres plus larges que le corselet, arrondies à la base et à l'extrémité; s'élargissant; cannelées et très finement ponctuées.

Sur chaque élytre une bande marginale latérale.

Dessus du corps vert-noir très foncé; dessous brun-foncé.

Palpes, antennes, yeux, bande des élytres et pattes jaunetestacé.

*Epomis Senegalensis* (GORY, Sénégal), du cabinet de  
M. Buquet.

(Long. 7 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 3 lign.)

*Viridi-cyaneus, elytris profunde striatis, margine antennis  
pedibusque flavis.*

Tête allongée, étroite, rétrécie postérieurement, ponctuée, surtout autour des yeux.

Corselet couvert de petites rides transversales et de points enfoncés très espacés, plus long que large, légèrement échancré antérieurement et à sa base, se rétrécissant postérieurement, avec une forte impression transversale, près du bord antérieur, et une longitudinale de chaque côté de sa base, la ligne du milieu peu sentie.

Ecusson lisse, triangulaire.

Elytres allongées, parallèles, arrondies à l'extrémité, fortement striées. Sur chaque élytre une bordure assez étroite.

Dessus du corps, vert bleu; lèvres supérieure, palpes, antennes, bordure et pattes, jaune-pâle; dessous du corps brun-noir.

*Oodes Gory* (BUQUET, Sénégal), du cabinet de M. Buquet.

(Long. 7 lign., larg. 3 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Ovatus, niger, elytris striatis, punctatis.*

Tête peu avancée, avec deux points enfoncés entre les yeux.

Corselet lisse, presque en forme de trapèze, légèrement

convexe, rétréci antérieurement, aussi large que les élytres à sa base, avec une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu, qui n'atteint ni son bord antérieur, ni sa base, et un point enfoncé de chaque côté d'elle.

Ecusson lisse, large, triangulaire.

Elytres larges, assez allongées, presque parallèles, arrondies postérieurement, striées et finement ponctuées, entièrement noir brillant.

*Oodes Rufipes* (GORY, Sénégal), du cabinet de M. Gory.

(Long. 3 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 2 lign.)

*Viridi-obscurus, elytris striatis, punctatis, antennis pedibusque piceis.*

Tête triangulaire, lisse.

Corselet convexe, presque en forme de trapèze, aussi large que les élytres à sa base; lisse, avec une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu, et une impression très marquée de chaque côté de la base.

Elytres beaucoup moins longues que dans l'*Helopioides*, arrondies à la base et à l'extrémité, finement striées et ponctuées.

Entièrement d'un vert très obscur; palpes, antennes et pattes, rouge ferrugineux.

*Oodes Politus* (GORY, Sénégal), du cabinet de M. Gory.

(Long. 3 lign., larg. 1 lign. 174.)

*Ovatus, niger, elytris lævigatis.*

Il ressemble, pour la taille et la forme, à l'*Oodes Sub-*

æneus de Dejean; mais les élytres sont plus convexes et lisses.

Corselet aussi large que les élytres, ayant ses angles postérieurs prolongés un peu sur elles.

Elytres carrées à la base, arrondies à l'extrémité.

Entièrement noir et lisse, avec les antennes et les tarse brun-noir.

*Dolichus Rufus* (GORY, cap de Bonne-Espérance), du cabinet de M. Gory.

(Long. 6 lign., larg. 2 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Alatus, rufus; elytris parallelis striatis, antennis tarsisque pubescentibus.*

Il est à-peu-près de la grandeur du Caffer d'Illiger.

Corselet se rétrécissant un peu postérieurement, presque en forme de cœur, très échancré à son bord antérieur, pour recevoir la tête; angles antérieurs saillans, bords latéraux relevés, angles postérieurs coupés carrément, ainsi que la base, près de laquelle on voit, de chaque côté, une assez forte impression, il a une ligne longitudinale dans son milieu, et quelques petites rides transversales.

Ecusson petit, arrondi.

Elytres finement striées, plus larges à l'extrémité, arrondies à la base, coupées carrément à l'extrémité, le long du bord externe, une rangée de points enfoncés, placés sur la neuvième strie.

Entièrement brun rouge, avec les derniers articles des antennes et des tarse pubescens.

*Pristonychus Algerinus* (GORY, Alger), du cabinet de M. Gory.

(Long. 8 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Niger, elytris cyaneis, striatis externe punctatis, antennis pedibusque rufis.*

Il ressemble beaucoup au Terricola, mais le corselet est moins allongé, moins en cœur.

Tête lisse, corselet avec ses bords latéraux relevés, rétréci postérieurement, ses angles saillans; une ligne longitudinale dans son milieu, une impression bien marquée de chaque côté de la base et des rides transversales, surtout dans les impressions.

Ecusson petit, arrondi.

Elytres avec des stries très minces, et peu enfoncées; très finement ponctuées: dans la huitième strie, de très gros points enfoncés. Antennes et pieds brun-rouge; entièrement noir, avec les élytres bleues.

*Pristonychus Chilensis* (GORY, Chili), du cabinet de M. Gory.

(Long. 5 lign.)

*Alatus, nigro-piceus, thorace subcordato; elytris oblongo-ovatis, striatis, striis obsolete punctatis.*

Il ressemble beaucoup au Complanatus de Dej.; mais le corselet est moins allongé, les impressions près de la base moins fortes et les élytres plus planes.

Tête très allongée, avec deux impressions longitudinales entre les yeux, et de petites rides transversales entre ces impressions.

Corselet un peu en cœur, avec une petite ligne longitudinale qui n'atteint ni son bord antérieur, ni sa base; de petites rides transversales et une légère impression de chaque côté de la base.

Elytres très planes, ovales, légèrement striées; le long du bord externe, de gros points.

Entièrement noir brun, avec les antennes et les pattes plus claires.

Cette espèce est la seule exotique de ce genre.

*Omalosoma Vigors* (GORY, Nouvelle-Hollande), du cabinet de M. Gory.

(Long. 13 lign., larg. 4 lign.)

*Nigra, thorace elongato, subquadrato postice subangustato; elytris elongatis subparallelis striato-punctatis, interstitiis alternatim costatis.*

Elle est plus grande que l'*Abax Schüppelii* de Dahl.; le seul individu que je possède est une femelle, et a ses stries tout-à-fait disposées comme celles de la femelle de l'*Abax Schüppelii*.

Tête grande, ovale, presque renflée postérieurement, lisse, avec deux impressions très larges entre les yeux.

Corselet plus large que la tête, rétréci postérieurement, échancré à sa partie antérieure et dans le milieu de sa base, avec les angles postérieurs coupés obliquement et ceux antérieurs arrondis, les bords relevés; lisse, avec une

ligne longitudinale dans son milieu et une impression longitudinale de chaque côté de sa base.

Ecusson ridé, court, arrondi.

Elytres allongées, presque parallèles, plus larges au-delà du milieu, assez planes, légèrement sinuées et presque arrondies à l'extrémité, le rebord de la base assez marqué, il forme à l'angle de la base une petite dent; sur chaque élytre, neuf stries qui sont ponctuées dans leur enfoncement, les second, quatrième et sixième intervalles presque planes, les autres très élevés et presque en carène.

Entièrement noir brillant, excepté les élytres noir mat.

Je dois cette belle espèce à la générosité de M. Vigors, entomologiste anglais, auquel je l'ai dédiée.

*Pœcilus Cyaneus* (CHEVROLAT, Alger), du cabinet de M. Gory.

(Long. 5 lign.)

*Subtus violaceus, desuper niger; elytris oblongo-ovatis, striatis obsolete punctatis.*

Tête couverte de petites rides transversales. Corselet lisse, plus large que la tête, aussi long que large, presque carré avec une ligne longitudinale dans son milieu, et une impression ponctuée de chaque côté de la base.

Ecusson petit, triangulaire, aigu.

Elytres fortément striées, un peu plus larges que le corselet, oblongues, avec une rangée de points enfoncés sur la neuvième strie.

Les deux premiers articles des antennes fauves, dessus du corps d'un beau bleu violacé, dessous, noir.

*Zabrus Gibbosus* (MÉNESTRIÉS, mer Caspienne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 5 lign.)

*Niger, thorace subquadrato, postice punctato, elytris parallelis, convexis, subtilissime striatis, antennis tarsisque rufis.*

Il ressemble, pour la forme, au *Gibbus* de Fabricius, mais il est plus petit, et les stries des élytres sont lisses.

Tête ovale, peu rétrécie postérieurement, corselet moins long que large, presque carré et assez convexe; la ligne longitudinale peu marquée, et les rides transversales ondulées, assez marquées, surtout sur les côtés, il est en outre finement ponctué.

Ecusson assez grand et triangulaire.

Elytres bombées, convexes, parallèles, très finement striées; il y a une rangée de gros points enfoncés sur la neuvième strie.

Entièrement noir brillant, avec les antennes et les tarsi fauves.

*Zabrus Globosus* (GORY, Alger), du cabinet de M. Gory.

(Long. 4 lign.)

*Nigro-piceus, capite thoraceque punctatis, elytris, striatis, antennis pedibusque ferrugineis.*

La forme du corselet se rapproche de celle des *Pelor*.

Tête finement ponctuée, avec deux gros points enfoncés

entre les yeux ; corselet bombé, ponctué, très arrondi, avec une petite ligne longitudinale dans son milieu.

Ecusson très petit, triangulaire, aigu.

Elytres très courtes, bombées, striées, mais lisses entre les stries, avec une rangée de gros points sur la neuvième strie.

Entièrement noir de poix, avec les antennes et les pattes ferrugineuses.

*Amblygnathus Niger* (GORY, Brésil), du cabinet de M. Gory.

*Niger, thorace rotundato, elytris subtilissime striatis, interstitiis lævigatis; antennis pedibusque fulvis.*

Antennes plus courtes que la tête et le corselet réunis.

Tête presque carrée, avec deux impressions longitudinales bien marquées entre les yeux, ceux-ci gris et assez apparens.

Corselet lisse, arrondi, coupé carrément à sa partie antérieure et à sa base, ses côtés un peu relevés, avec une ligne longitudinale dans son milieu et une impression bien sentie, finement ponctué de chaque côté de sa base.

Ecusson lisse, petit, triangulaire.

Elytres finement striées, les intervalles lisses, carrées à la base, arrondies à l'extrémité, quelques points enfoncés du côté externe, et ne commençant qu'à la moitié de leur longueur.

Entièrement noir brillant, antennes et pattes fauves.

*Selenophorus Confusus* (GORY, Sénégal), du cabinet de M. Gory.

(Long. 6 lign., larg. 2 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Ovatus, nigro-piceus; thorace subquadrato; postice subangustato, utrinque obsolete foveolato; elytris striatis, striis obsolete punctatis, antennis pedibusque ferrugineis.*

Cette espèce ressemble beaucoup au *Piceus* de Dejean, elle en diffère cependant par la taille et le dessus des élytres qui n'est point ponctué.

Tête lisse, avec quelques petites impressions entre les yeux; elle est peu rétrécie postérieurement.

Corselet lisse, plus large que long, arrondi sur les côtés, légèrement échancré à sa partie antérieure, avec ses bords relevés et ses angles antérieurs et postérieurs arrondis, une ligne longitudinale peu marquée dans son milieu, et quelques petites rides longitudinales de chaque côté de sa base.

Ecusson très court, triangulaire, aigu.

Elytres striées, arrondies à la base, sinuées à l'extrémité, allongées, presque parallèles, ovales, et un peu convexes.

Brun noirâtre, avec un reflet métallique sur les élytres.

Antennes et pattes ferrugineuses.

*Selenophorus Fulvipes* (GORY, Sénégal), du cabinet de M. Gory.

(Long. 5 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Pisceus, elytris subtilissime striatis, ore, antennis pedibusque testaceis.*

Cet insecte appartient à la deuxième division des *Selenophorus* de M. Dejean (*Pangus*).

Corselet plus large que long, arrondi sur les côtés et à ses angles, une ligne longitudinale dans son milieu, avec quelques petites impressions.

Ecusson court, triangulaire.

Elytres un peu plus larges que le corselet, carrées à leur base, légèrement sinuées à leur extrémité, avec des stries peu senties, et une rangée de gros points enfoncés le long de chaque bord externe.

Entièrement couleur de poix; premier article des antennes, bouche et pattes, jaune-pâle.

Reste des antennes pubescent.

*Selenophorus Cupreus* (GORY, Sénégal), du cabinet de M. Gory.

(Long. 5 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 2 lign.)

*Viridi-cupreus, elytris striatis, punctatis, antennis pedibusque testaceis.*

Tête finement ponctuée, avec une forte impression de chaque côté près des yeux.

Corselet plus large que long, très arrondi sur les côtés, coupé carrément à sa partie antérieure et à sa base, ses angles antérieurs et postérieurs arrondis, ses bords un peu relevés, ponctué sur les côtés et plus fortement de chaque côté de sa base, avec une ligne longitudinale assez marquée dans son milieu.

Ecusson court, triangulaire, aigu.

Elytres presque carrées à la base, ovales, presque parallèles, sinuées à l'extrémité, avec chaque bord externe relevé, surtout à l'angle huméral, striées, ponctuées, surtout

le long du bord externe; vert cuivreux, plus rouge sur les élytres, dessous du corps brun, antennes et pattes, jaune testacé.

*Selenophorus Cupripennis* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 6 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 2 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Ovatus, convexus, rubro-cupreus, thorace punctato, postice quadrato, elytris subtilissime striatis, striis granulatis, antennis fulvis, pedibusque nigris.*

Tête large, plane, fortement ponctuée, avec une impression très marquée près de l'insertion de chaque antenne.

Corselet carré, couvert de gros points enfoncés très serrés; fortement échancré à sa partie antérieure, carré à sa postérieure, ses angles antérieurs arrondis, ceux postérieurs aigus et ses bords relevés, une impression en arc de cercle au-dessous de l'échancrure de la partie antérieure, avec une petite ligne longitudinale enfoncée, qui part de cette impression et ne descend pas tout-à-fait à la base.

Écusson triangulaire, très court.

Elytres un peu plus larges que le corselet, allongées, parallèles, serrées à la base, sinuées à l'extrémité. Sur chaque élytre, neuf stries peu profondes, lisses et assez larges; de chaque côté une rangée de petits points enfoncés et entre ces points une granulation assez forte et disposée en longueur.

Tête, corselet vert cuivreux, élytres, dessous du corps plus foncé, pattes, noir brillant, antennes fauves, surtout le premier article qui est plus pâle que les autres.

Cet insecte a été trouvé à Cayenne et envoyé par M. Laccordaire et désigné dans son troisième catalogue sous le numéro 32.

*Hypolithus Vicinus* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 5 lign.  $\frac{1}{2}$ , larg. 2 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Fuscus, pubescens; thorace subquadrato, angulis posticis subrotundatis, elytris striatis, pubescentibus, pedibus nigris.*

Cette espèce ressemble au *Tomentosus* de Dejean, mais elle est plus petite et les pattes sont noires, tandis que dans le *Toméntosus* elles sont testacées.

Tête assez grande, triangulaire, ponctuée, avec une impression de chaque côté le long des yeux.

Corselet plus large que la tête, aussi long que large, presque carré, très légèrement rétréci antérieurement, presque plane, très finement ponctué, la ligne longitudinale du milieu très peu marquée, avec une impression oblongue, assez large, et très peu marquée de chaque côté de la base, le bord antérieur très peu échancré, les angles antérieurs presque arrondis, les côtés peu relevés, les angles postérieurs obtus et arrondis, la base coupée carrément.

Elytres striées, plus larges que le corselet, allongées, presque parallèles et un peu sinuées à l'extrémité.

Entièrement brun, avec le dessus couvert de petits poils serrés qui le fait paraître pubescent.

*Hypolithus Javanus* (GORY, Java), du cabinet de  
M. Gory.

(Long. 3 lig.  $\frac{1}{2}$ , larg. 1 lign.  $\frac{1}{2}$ .)

*Niger, elytris striatis, granulatis, antennis pedibusque  
pallide testaceis.*

Tête petite, arrondie, un peu convexe, couverte de petits points enfoncés, avec une impression de chaque côté, près des yeux.

Corselet légèrement échancré à sa partie antérieure, coupé carrément à sa base, arrondi sur les côtés qui sont légèrement rebordés, rétréci postérieurement, ayant ses angles antérieurs arrondis et ceux postérieurs assez aigus, entièrement ponctué.

Elytres striées, plus larges que le corselet, allongées, légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes, sinuées à l'extrémité.

Entièrement noir, avec les antennes et les pattes d'un jaune-pâle.

*Harpalus Gory* (BOISDUVAL, Nouvelle-Hollande),  
du cabinet de M. Gory.

(Long. 8 lign.)

*Subviolaceus, thorace oblongo, elytris striatis, postice latioribus, subtilissime punctatis, antennis tarsisque ferrugineis.*

Tête lisse, avec deux petites impressions longitudinales entre les yeux, ceux-ci assez gros et gris.

Corselet oblong, lisse, avec ses angles antérieurs baissés et arrondis, ses postérieurs carrés, sa base légèrement échancrée, une ligne longitudinale assez marquée dans son milieu et, de chaque côté de la base, une petite impression longitudinale.

Ecusson petit, triangulaire, aigu.

Élytres striées, carrées à leur base, oblongues, ayant leurs angles huméraux relevés comme dans quelques Scarites, se rétrécissant postérieurement.

Sur chaque élytre deux gros points placés sur la troisième strie; le premier, vers les deux tiers de la longueur, le second un peu avant l'extrémité, et sur la neuvième strie, une rangée de gros points.

Dessus du corps violacé, dessous noir, palpes, antennes et tarsi ferrugineux, les trois premiers articles des antennes plus foncés.

*Tetragonoderus Bax* (GORY, Sénégal), du cabinet de M. Gory.

(Long. 3 lig.)

*Capite, thorace punctatissimis, viridibus; elytris subquadratis, punctato-striatis, testaceis, macula media communi subtriangulari suturaque basi viridibus, pedibusque pallide testaceis.*

Lèvre supérieure et mandibules brun roussâtre.

Tête triangulaire, fortement ponctuée; corselet pubescent, beaucoup plus large que la tête, court, très arrondi sur les côtés, avec une ligne longitudinale dans son milieu et fortement ponctué.

Écusson petit, triangulaire, aigu.

Élytres pubescentes, beaucoup plus larges que le corselet, un peu ovales, arrondies à leur extrémité, elles sont striées et ponctuées, les intervalles le sont aussi.

Sur chaque élytre une large bande commune aux deux, descend le long de la suture, se dilate transversalement et se rétrécit après cette dilatation sans cependant aller atteindre l'extrémité.

Cette bande, la tête, le corselet, sont d'un vert noirâtre brillant, tout le reste du corps jaune testacé, ainsi que les trois premiers articles des antennes.

*Tetragonoderus Quadri-maculatus* (GORY, Sénégal),  
du cabinet de M. Gory.

(Long. 2 lign. 172.)

*Niger, elytris oblongis, punctato striatis, maculis duabus croceis, antennarum basi, pedibusque testaceis.*

Il ressemble un peu au *Viridicollis* de M. Dejean, par la disposition des taches des élytres. Tête triangulaire, lisse.

Yeux gros; gris

Corselet arrondi sur ses côtés, avec une ligne longitudinale dans son milieu, assez sentie, une impression profonde de chaque côté de la base et quelques rides longitudinales vis-à-vis de l'écusson.

Élytres oblongues, assez fortement striées et finement ponctuées, légèrement sinuées à leur extrémité; sur chaque élytre deux taches irrégulières, la première près de la base, la seconde triangulaire; un peu avant l'extrémité.

Noir; palpes, base des antennes, et pattes, jaune testacé, tache des élytres jaune d'ocre.

*Tetragonoderus Leprieur* (BUQUET, Sénégal), du cabinet de M. Gory.

(Long. 2 lign., larg. 1 lign.)

*Capite thoraceque viridi-cupreis; elytris elongatis, albican-*  
*tibus, basi, apice, fascia media sinuata æneis; antennis.*  
*pedibusque ferrugineis.*

Il ressemble beaucoup au *Variegatus*, cependant il en diffère par la forme du corselet et les élytres qui sont plus allongées.

Tête lisse, triangulaire, peu convexe.

Corselet moins long que large, presque carré, très rétréci postérieurement, très arrondi antérieurement sur les côtés, la ligne longitudinale du milieu peu marquée, l'impression transversale antérieure, en croissant peu distinct, et de chaque côté de la base une impression oblongue très marquée, les côtés relevés et les angles postérieurs coupés carrément.

Elytres striées, allongées, presque parallèles, et tronquées obliquement à l'extrémité. Sur chaque élytre, des atomes blancs qui forment des taches irrégulières.

Les trois premiers articles des antennes et les pattes ferrugineux, tout le reste vert cuivreux.

*Lachnophorus Niger* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 1 lign.  $3\frac{1}{4}$ , larg.  $1\frac{1}{2}$  lign.)

*Niger, thorace cordato, angulis posticis rectis; elytris sub-parallelis, striatis, profunde punctatis.*

Tête ponctuée, yeux saillans.

Corselet aussi large que la tête, y compris les yeux, un peu plus long que large, très arrondi sur les côtés antérieurement, très rétréci postérieurement, fortement cordiforme et très convexe, avec une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu, très marquée; l'impression transversale antérieure assez distincte, celle postérieure plus fortement marquée.

Écusson petit, triangulaire, aigu.

Elytres beaucoup plus larges que le corselet, presque parallèles, peu convexes, carrées à la base, arrondies à l'extrémité, striées et très fortement ponctuées.

Entièrement noir brillant et couvert de poils longs de cette couleur.

Cet insecte a été trouvé et envoyé par M. Lacordaire, et désigné dans son troisième catalogue sous le numéro 24.

*Lachnophorus Bipunctatus* (GORY, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

*Lachnophorus Sex-punctatus?* Dej. catal., pag. 49.

(Long. 2 lign.)

*Niger pilosus, elytris striatis, punctatissimis, duabus maculisque rufis.*

Tête triangulaire, rugueuse.

Yeux très gros, gris; corselet cordiforme, ponctué.

Elytres striées et fortement ponctuées, beaucoup plus larges que le corselet, carrées à la base, parallèles et arrondies à l'extrémité; sur la seconde strie, trois gros points et une tache rouge vers les deux tiers.

Entièrement noir, avec longs poils.

Les trois premiers articles des antennes, et la tache de chaque élytre, rouges.

*Bembidium Cupreum* (GORY, Sénégal), du cabinet de M. Buquet.

(Long. 2 lign., larg. 3¼ lign.)

*Viridi obscurum, elytris striatis; antennarum basi, tibiis tarsisque testaceis.*

Tête triangulaire, peu rétrécie postérieurement.

Corselet transversal, échancré à son bord antérieur, rétréci postérieurement, avec ses angles arrondis et ses bords relevés, la ligne longitudinale du milieu n'atteint ni le bord antérieur, ni la base.

Elytres striées, plus larges que le corselet, peu allongées et peu sinuées obliquement à l'extrémité.

Entièrement vert obscur, avec la base des antennes, les tibias et les tarsi, jaunes.

*Bembidium Aurichalceum* (LACORDAIRE, Cayenne), du cabinet de M. Gory.

(Long. 1 lign. 1½.)

*Viridi-obscurum, punctatum, antennis pedibusque ferrugineis.*

Tête avec des impressions assez marquées entre les yeux, ceux-ci gros et gris.

Corselet ponctué, avec ses angles postérieurs très relevés, une ligne longitudinale dans son milieu qui n'atteint pas l'impression transverse qui est au-dessus de sa base.

Elytres arrondies à la base et à l'extrémité, plus fortement ponctuées du côté des bords externes.

D'un vert obscur brillant, antennes et pattes ferrugineuses.

*Bembidium Taciturnum* (GORY, Sénégal), du cabinet de M. Gory.

(Long. 2 lign.)

*Cupreum, elytris striatis, antennis pedibusque fuscis.*

Tête lisse, avec une petite impression entre les yeux.

Corselet arrondi, avec une impression transversale à sa partie antérieure et à sa base, et une ligne longitudinale entre l'impression de la partie antérieure et celle de la base.

Ecusson petit, triangulaire.

Elytres arrondies, striées.

Entièrement vert noirâtre, élytres chatoyantes, antennes et pattes brunes.